

Алергія

1. Хворого вкусила бджола в праве плече і він звернувся до медсестри зі скаргами на набряк обличчя та свербіння в місці укусу. Яку невідкладну допомогу треба надати хворому?
 - A. Накласти пов'язку з фурациліном
 - B. *Прикласти міхур з льодом до місця укусу, ввести супрастин в/м
 - C. Обробити розчином йодонату
 - D. Ввести 50% розчин анальгін
 - E. Прикласти грілку до місця укусу
2. У пацієнтки після вживання полуниць виник набряк обличчя, особливо набряклими є губи і ніс. Потім з'явилися ядуха, гавкаючий кашель. Дихання утруднене, захриплість голосу. Який стан розвинувся у пацієнтки?
 - A. Анафілактичний шок
 - B. *Набряк Квінке
 - C. Кропив'янка
 - D. Напад бронхіальної астми
 - E. Алергічний ларингіт
3. У пацієнта 50-ти років через годину після вживання в їжу полуниць, виникла слабкість, свербіж шкіри, з'явився однотипний еритематозно-пухирцевий висип на шкірі тулуба і кінцівок. Який стан розвинувся у пацієнта?
 - A. Напад бронхіальної астми
 - B. Сироваткова хвороба
 - C. Анафілактичний шок
 - D. *Кропив'янка
 - E. Набряк Квінке
4. Хворий 25-ти років з діагнозом: нижньочасткова пневмонія знаходиться на лікуванні в стаціонарі. Лікар призначив внутрішньом'язово антибіотик. Що повинна зробити медична сестра перед введенням антибіотика?
 - A. Розвести антибіотик дистильованою водою 38оС
 - B. Підігріти розчин на водяній бані до 37-38оС
 - C. *Діагностична проба на індивідуальну чутливість до антибіотиків
 - D. Розвести антибіотик 2% розчином новокаїну
 - E. Попередити пацієнта, що після ін'єкції він повинен поїсти
5. Під час внутрішньовенного введення ліків у хворого з'явилися ознаки анафілактичного шоку. Надання допомоги необхідно розпочати з:
 - A. Подачі кисню
 - B. Введення адреналіну підшкірно
 - C. Введення еуфіліну внутрішньовенно
 - D. *Накладання джгута на кінцівку
 - E. Введення преднізолону внутрішньовенно

6. У хворого після ін'єкції антибіотика виник анафілактичний шок. Що слід використати при наданні невідкладної допомоги?
- A. Но-шпа
 - B. *Адреналін
 - C. Дибазол
 - D. Анальгін
 - E. Дицинон
7. Ви медична сестра алергологічного відділення. Який з перерахованих препаратів має найвищу ймовірність викликати алергічну реакцію?
- A. Хлористий кальцій
 - B. Аскорбінова кислота
 - C. Розчин глюкози
 - D. * Протиправцева сироватка
 - E. Фізіологічний розчин
8. Що в першу чергу повинна зробити медична сестра для попередження алергічних ускладнень при введенні антибіотиків?
- A. Вводити антибіотик невеликими дозами
 - B. *Провести пробу на чутливість до антибіотика
 - C. З'ясувати термін придатності антибіотика
 - D. Правильно обрати шлях введення антибіотика
 - E. –
9. Причиною анафілактичного шоку є:
- A. Переливання несумісної крові
 - B. *Гіперчутливість до деяких медикаментів
 - C. Гострий біль при травмах
 - D. Дія іонізуючої радіації
 - E. Токскоінфекції
10. У хворого на пневмонію після введення цефтріаксону виник анафілактичний шок. Що могло запобігти розвитку цього ускладнення?
- A. Бактеріологічне дослідження крові
 - B. Термометрія
 - C. Вимірювання АТ
 - D. * Проба на індивідуальну чутливість до антибіотика
 - E. Підрахунок ЧД
11. Студент після вживання полуниці, відчув раптово інтенсивне свербіння в ділянці спини і стегон. При огляді виявлено на гіперемійованому фоні висипання у вигляді міхурців. АТ-120/80 мм.рт.ст, пульс - 82уд./хв. Яке захворювання розвинулось?
- A. * Кропив'янка
 - B. Анафілактичний шок

- C. Харчове отруєння
- D. набряк Квінке
- E. Геморагічний васкуліт

12. Пацієнт 20 років лікується з приводу геморагічного васкуліту (хв. Шенляйна-Геноха). Заплануйте навчання пацієнта з профілактики рецидивів:

- A. *Уникнення контактів з алергенами
- B. Загартовування організму
- C. Раціональне харчування
- D. Нормалізація ваги
- E. Запобігання травматизації, вібрації

13. Вкажіть основну групу ліків для лікування алергічних захворювань:

- A. антиагреганти
- B. антациди
- C. антагоністи кальцію
- D. *антигістамінні
- E. Антидепресанти

14. Пацієнт з приводу пневмонії призначений антибіотик - цефазолін. Раптово після першої ін'єкції у пацієнта з'явилося відчуття жару, потім став блідим, утруднення дихання; пульс ниткоподібний. АТ - 85/60 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у пацієнта:

- A. *Анафілактичний шок
- B. набряк Квінке
- C. Напад ядухи
- D. набряк легенів
- E. Колапс

15. До медичної сестри звернувся пацієнт, у якого після вживання citrusових з'явився сильний свербіж та почервоніння шкіри, уртикарний висип. Яка основна проблема у цього пацієнта?

- A. Біль голови
- B. Підвищення температури
- C. *Свербіж шкіри
- D. Серцебиття
- E. Задишка

16. У хворого на пневмонію після введення цефтріаксону виник анафілактичний шок. Що могло запобігти розвитку цього ускладнення?

- A. Бактеріологічне дослідження крові
- B. Термометрія
- C. Вимірювання АТ
- D. *Проба на індивідуальну чутливість до антибіотика
- E. Підрахунок ЧД

17.3 метою профілактики анафілактичного шоку застосовують:

- A.** *Пробу на чутливість до антибіотиків
- B.** Пробу Манту
- C.** Антигістамінні препарати
- D.** Санацію хронічних вогнищ інфекції
- E.** Раціональне харчування