

## ГАСТРО

- У пацієнта, хворого на виразкову хворобу шлунка, з'явилися блювання "кавовою гущею", слабкість. Пацієнт блідий, Рс-100/хв., слабого наповнення і напруження, АТ- 80/40 мм рт.ст. Що має зробити медична сестра?
  - Покласти міхур з льодом на поперекову ділянку
  - Покласти гірчичник на ділянку серця
  - \*Покласти міхур з льодом на епігастральну ділянку
  - Покласти гірчичники на потилицю
  - Покласти грілку на епігастральну ділянку
- Характерною ознакою якого захворювання є напад гострого болю в правому підребер'ї з іррадіацією в праве плече та поява нудоти і блювання?
  - Хронічний гастрит
  - Виразкова хвороба
  - \*Жовчно-кам'яна хвороба
  - Цироз печінки
  - Хронічний гепатит
- Пацієнтка 42-х років скаржиться на розпираючий біль у животі, відсутність випорожнень впродовж 3 діб. У своїй дієті дотримується обмежень, побоюючись загострення хвороби. Лікар призначив їй очисну клізму. Скільки води і якої температури необхідно підготувати для постановки очисної клізми?
  - 150 мл, температура 37оС
  - 2 л, температура 30оС
  - 0,5 л, температура 35оС
  - 1,5 л, температура 37оС
  - \*1,5 л, температура 28оС
- Пацієнт 45-ти років поступив в стаціонар зі скаргами на гіркоту в роті, особливо вранці, ниючий біль у правому підребер'ї, нудоту, здуття живота. Хворіє на хронічний холецистит. Яку дієту слід призначити пацієнту?
  - № 9
  - № 10
  - \*№ 5
  - № 7
  - № 1
- Жінка скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, миготіння "мушок" перед очима; виглядає блідою. В анамнезі: геморої, який супроводжується періодичними кровотечами. Що у хворої?

- A. Цироз печінки
- B. Виразкова хвороба
- C. \*Постгеморагічна анемія
- D. Тромбоцитопенічна пурпура
- E. Гіпертонічна хвороба

6. Хворий 52 років, скаржиться на слабкість, зниження апетиту, свербіж шкіри, біль у правому підребір'ї. В анамнезі вірусний гепатит С. Об'єктивно: іктеричність шкіри та слизових оболонок, телеангіоектазії, живіт збільшений за рахунок асцити, печінка на 5см нижче реберної дуги, край її гострий, болючий. Про яке захворювання можна подумати?

- A. \*Цироз печінки
- B. Хронічний гепатит
- C. Жовчнокам'яну хворобу
- D. Панкреатит
- E. Рак печінки

7. Жінка 28-ми років знаходиться на диспансерному обліку з діагнозом: хронічний гастрит типу А. Звернулася до сімейної медсестри за рекомендацією лікувальної мінеральної води. Яка мінеральна вода найбільш доцільна?

- A. \*Миргородська
- B. Боржомі
- C. Свалява
- D. Поляна Квасова
- E. Лужанська

8. Пацієнту хірургічного відділення 49-ти років з атонічним закрепом лікар призначив гіпертонічну клізму. Який розчин повинна застосувати медична сестра для цієї клізми?

- A. 5% розчин глюкози
- B. 10% розчин кальцію хлориду
- C. \*25% розчин магнію сульфату
- D. 0,9% розчин натрію хлориду
- E. 2% розчин новокаїну

9. Хворий знаходиться на лікуванні у гастроентерологічному відділенні. Два роки тому діагностована виразкова хвороба шлунку. Вранці самопочуття хворого різко погіршилось, з'явилися нудота, блювання "кавовою гущею". Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- A. Стеноз ворота

- В.** Перфорація виразки
- С.** Кишкова непрохідність
- Д.** \*Шлункова кровотеча
- Е.** Харчове отруєння

**10.** Хворий 52-х років скаржиться на слабкість, зниження апетиту, свербіж шкіри, біль у правому підребер'ї. В анамнезі вірусний гепатит С. Об'єктивно: іктеричність шкіри та слизових оболонок, телеангіоектазії, живіт збільшений за рахунок асцити, печінка на 5 см нижче реберної дуги, край її гострий, болючий. Про яке захворювання можна подумати?

- А.** Хронічний гепатит
- В.** Рак печінки
- С.** Панкреатит
- Д.** Жовчнокам'яна хвороба
- Е.** \*Цироз печінки

**11.** На I етапі сестринського обстеження медсестра виявила чинники, які зумовили розвиток хронічного коліту у пацієнта. Який з них належить до ендогенних?

- А.** Психоемоційний стрес
- В.** Нерегулярне харчування
- С.** Гіподинамія
- Д.** \*Перенесена дизентерія
- Е.** Вживання великої кількості рідини

**12.** До приймального відділення машиною швидкої допомоги доставлено пацієнта з шлунково-кишковою кровотечею. Три години тому було блювання у вигляді "кавової гущі". Суб'єктивно: почуває себе задовільно, може рухатись самостійно. Як транспортувати пацієнта до відділення стаціонару?

- А.** На кріслі-каталці
- В.** \*На каталці, лежачи
- С.** Самостійно у супроводі медичної сестри
- Д.** Самостійно без супроводу
- Е.** На ношах двома санітарами

**13.** Пацієнт 42-х років госпіталізований у гастроентерологічне відділення з діагнозом: хронічний гастрит типу В. Вкажіть препарат, який доцільно застосувати для зниження секреції соляної кислоти:

- А.** Ретаболіл
- В.** Регідрон
- С.** Раунатин

- D. Реланіум
- E. \*Ранітидин

14. Хворий 60-ти років скаржиться на затримку випорожнень та невідходження газів впродовж трьох діб, нудоту, блювання шлунковим вмістом, постійний розпираючий біль по всьому животу. Об'єктивно: живіт здутий, симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний на всьому протязі, при аускультатії є "шум плескоту" та "шум падаючої краплі". Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Перфоративна виразка шлунку
- B. Гострий панкреатит
- C. Рак шлунку
- D. \*Гостра механічна кишкова непрохідність
- E. Гострий апендицит

15. Медсестра під час проведення шлункового зондування тонким зондом помітила у шлунковому вмісті значну кількість крові. Які її першочергові дії?

- A. \*Припинити зондування
- B. -
- C. Зробити перерву
- D. Поставити грілку на живіт
- E. Продовжити зондування

16. Швидкою допомогою до лікарні доставлено пацієнта П. 50-ти років зі скаргами на біль у животі, блювання після вживання алкоголю. При обстеженні виявлено високий показник діастази в аналізі сечі. Про яке захворювання свідчать ці дані?

- A. Гострий холецистит
- B. Жовчнокам'яна хвороба
- C. Проривна виразка шлунку
- D. \*Гострий панкреатит
- E. Гострий апендицит

17. Чоловік 35 років скаржиться на нудоту, блювання, біль оперізуючого характеру, слабкість. Такий стан розвинувся після вживання алкоголю та гострої, жирної їжі. Під час огляду: шкіра бліда, язик обкладений сірим нальотом, живіт болючий в епігастрії, у більшій мірі зліва. Яке дослідження найбільш інформативне для встановлення діагнозу?

- A. Копрологічне дослідження
- B. \*Аналіз сечі та крові на діастазу
- C. Аналіз калу на приховану кров
- D. Загальний аналіз сечі
- E. Аналіз крові на цукор

18. Жінка 28-ми років перебуває на диспансерному обліку з діагнозом: хронічний гастрит типу А. Звернулася до сімейної медсестри, щоб їй порекомендували лікувальну мінеральну воду. Яка мінеральна вода найбільш доцільна в даному випадку?

- A. \*Миргородська
- B. Боржомі
- C. Лужанська
- D. Свалява
- E. Поляна Квасова

19. Пацієнтка В. 52-х років хворіє на жовчнокам'яну хворобу. Після порушення дієти виник інтенсивний біль у правому підребер'ї. Які засоби долікарської допомоги допоможуть зменшити біль?

- A. Міхур з льодом на праве підребер'я
- B. Ножні ванни
- C. \*Грілка на ділянку правого підребер'я
- D. Гірчичник на грудну клітку
- E. Банки на грудну клітку

20. До приймального відділення машиною швидкої допомоги доставлено пацієнта з шлунково-кишковою кровотечею. Три години тому було блювання у вигляді "кавової гущі". Суб'єктивно: почуває себе задовільно, може рухатися самостійно. Як транспортувати пацієнта до відділення стаціонару?

- A. Самостійно у супроводі медичної сестри
- B. \*На каталці, лежачи
- C. На ношах двома санітарами
- D. Самостійно без супроводу
- E. На кріслі-каталці

21. В терапевтичному відділенні лікується пацієнт Л. 39 років з хронічним колітом. Від яких чинників буде залежати стан пацієнта при проведенні медсестринського процесу?

- A. Професіоналізму медичної сестри
- B. Взаємодії медсестри і родичів пацієнта
- C. \*Взаємодії медичної сестри і пацієнта
- D. Взаємодії медсестри і лікаря
- E. Взаємодії медсестри і старшої медсестри

22. Медсестринська діагностика перфоративної виразки шлунку базується на таких головних ознаках (тріада Мондора):

- A. \*"Кинджальний" біль, "дошкоподібний" живіт, виразковий анамнез
- B. Головний біль, запаморочення, загальна слабкість
- C. Нудота, блювання, затримка випорожнення
- D. Зниження АТ, тахікардія, втрата свідомості
- E. Кровотеча, зяяння країв рани, порушення функції

**23.** У хворого раптово виникли загальна слабкість, блювота у вигляді кавової гущі, чорні випорожнення. До якого обстеження медсестра повинна підготувати даного хворого?

- A.** Зондування шлунку
- B.** Рентгенографія шлунку
- C.** \*Езофагогастродуоденофіброскопія
- D.** Промивання шлунку
- E.** Ректороманоскопія

**24.** Медична сестра, пояснюючи пацієнту принципи і режим раціонального харчування, звернула його увагу на те, що останній прийом їжі має бути не пізніше ніж:

- A.** \*За 2-2,5 години до сну
- B.** За 4 години до сну
- C.** За 0,5 годин до сну
- D.** За 1,5 години до сну
- E.** За 1 годину до сну

**25.** Пацієнт скаржиться на часті носові кровотечі, болі в правому підребір'ї, втрату апетиту. При огляді – істеричність шкіри та слизових, судинні "зірочки", на передній черевній стінці - "голова медузи". Яку патологію можна припустити?

- A.** \*Цироз печінки
- B.** Холецистит
- C.** Коліт
- D.** Вірусний гепатит
- E.** Виразкова хвороба

**26.** В приймальне відділення швидкою допомогою доставлена хвора 42-х років зі скаргами на біль в епігастральній ділянці, нудоту, блювання, слинотечу, головний біль, різку загальну слабкість. Із анамнезу: 2 години тому вживала недоброякісну їжу. Визначте першочергове медсестринське втручання:

- A.** Введення спазмолітиків
- B.** Дати випити розчин содової води
- C.** Заспокоїти пацієнтку, дати теплу грілку
- D.** \*Промивання шлунка
- E.** Дати випити шлунковий сік

**27.** Медсестра складає план догляду за пацієнтом, якому лікар визначив попередній діагноз: хронічний коліт. До якого лабораторного дослідження повинна підготувати пацієнта медична сестра?

- A.** Аналіз крові на ревмопроби
- B.** \*Аналіз калу на копрограму
- C.** Аналіз крові на залишковий азот

- D. Аналіз сечі на глюкозу
- E. Аналіз харкотиння

28. У жінки 50-ти років після вживання смаженої їжі та алкоголю з'явився сильний оперізуючий біль у верхній половині живота, що супроводжується нудотою, багаторазовим блюванням, яке не приносить полегшення. Про що може подумати медична сестра?

- A. Гострий холецистит
- B. Виразкова хвороба шлунка
- C. \*Гострий панкреатит
- D. Ентероколіт
- E. Виразковий езофагіт

29. При обстеженні пацієнта 48-ми років медична сестра виявила скарги на відсутність апетиту, відразу до м'ясної їжі та рибних страв, відчуття важкості в епігастрії, нудоту, втрату маси тіла. При пальпації живота відмічається болісність в епігастральній ділянці, палькується пухлиноподібне утворення. Яке захворювання запідозрить медсестра?

- A. Хронічний ентероколіт
- B. \*Рак шлунка
- C. Холецистопанкреатит
- D. Виразкова хвороба шлунка
- E. Хронічний гастрит

30. Хворий 71-го року поступив на лікування в терапевтичне відділення. Скаржився на часті носові кровотечі, свербіж шкіри, кровоточивість, судинні зірочки на шкірі. Про яку патологію можна подумати?

- A. Холецистит
- B. Вірусний гепатит
- C. \*Цироз печінки
- D. Виразкова хвороба
- E. Ентероколіт

31. Хворий геріатричного відділення знаходиться на ліжковому режимі. З метою профілактики розвитку гіпостатичної пневмонії медсестра повинна включити в план догляду:

- A. Зміну білизни
- B. Догляд за порожниною рота
- C. Профілактику пролежнів
- D. Вимірювання тиску
- E. \*Дихальна гімнастика

32. Медична сестра проводить шлункове зондування з застосуванням парентерального подразника. Для отримання максимальної (стимульованої) секреції вона використовує:

- A. 25% розчин магнію сульфату
- B. 10% розчин хлориду натрію
- C. 75 ОД інсуліну
- D. 5 ОД пітуїтрину
- E. \*0,1% розчин гістаміну

**33.**Хвора 39-ти років скаржиться на гострий, "кинджальний" біль у животі, різку загальну слабкість. Захворіла раптово після фізичного навантаження. В анамнезі - виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. Об'єктивно: обличчя бліде, шкіра вкрита холодним потом, живіт дошкоподібний. Яке ускладнення розвинулося у хворої?

- A. Пілоростеноз
- B. \*Перфорація
- C. Малігнізація
- D. Пенетрація
- E. Шлункова кровотеча

**34.**Пацієнту із загостренням хронічного холециститу унаслідок зневоднення лікар призначив ректальне введення 5% розчину глюкози та розчин Рінгера. Що необхідно зробити медсестрі перед виконанням цієї процедури?

- A. Зробити сифонну клізму
- B. Дати 50 мл рицинової олії
- C. \*Зробити очисну клізму
- D. Дати 100 мл відвару ромашки
- E. Дати таблетки активованого вугілля

**35.**У пацієнтки 43-х років загострення хронічного холециститу, скарги на ниючий біль у 37,5oC, правому підребер'ї, відрижку повітрям, гіркоту в роті, температуру тіла - слабкість. Яку проблему пацієнтки слід вважати пріоритетною?

- A. Відрижка повітрям
- B. \*Ниючий біль у правому підребер'ї
- C. Підвищення температури тіла
- D. Слабкість
- E. Гіркота в роті

**36.**Хвора 25-ти років скаржиться на нудоту, відрижку повітрям, відчуття тяжкості в епігастрії, проноси. Під час огляду: язик обкладений білим нальотом, живіт болючий в епігастральній ділянці. Яке дослідження є найбільш інформативним?

- A. Дуоденальне зондування
- B. \*рН-метрія
- C. Загальний аналіз сечі
- D. Загальний аналіз крові
- E. Копрологічне дослідження



37. Хворому на хронічний коліт, із схильністю до закріпів, призначили дієту №3. Який із зазначених продуктів НЕ РЕКОМЕНДОВАНО включати до харчового раціону?

- A. Пісне м'ясо
- B. Висівковий хліб
- C. Річкова риба
- D. Копчена ковбаса
- E. \*Бобові

38. В приймальне відділення районної лікарні поступив хворий зі скаргами на тупий постійний біль оперізувального характеру, нудоту, блювання. Які залежні дії медичної сестри для уточнення діагнозу?

- A. Виконати дуоденальне зондування
- B. Взяти кал для копрограми
- C. Підготувати пацієнта до ректороманоскопії
- D. \*Взяти сечу на діастазу
- E. Підготувати пацієнта до колоноскопії

39. В приймальне відділення швидкою допомогою доставлена хвора 42 років зі скаргами на біль в епігастральній ділянці, нудоту, блювання, сли-нотечу, головний біль, різку загальну слабкість. Із анамнезу відомо, що вона 2 години тому вживала недоброякісну їжу. Визначте першо-чергове медсестринське втручання:

- A. \*Промієте шлунок
- B. Введете спазмолітики
- C. Дасте випити шлунковий сік
- D. Заспокоїте пацієнтку, дасте теплу грілку
- E. Дасте випити розчину содової води

40. Пацієнт А., 37 років, потрапив у відділення зі скаргами на нудоту, блювання, біль в епігастрії, відрижку, пронос. Даний стан пов'язує з вживанням недоброякісної їжі. Встановлено діагноз: "Гострий гастрит". Які першочергові дії медсестри?

- A. Призначити дієту
- B. \*Промити шлунок
- C. Призначити ліжковий режим
- D. Ввести спазмолітині ліки
- E. Призначити проти блювотні ліки

41. Який препарат призначають хворим на хронічний панкреатит з метою замісної терапії?

- A. Атропін
- B. Алахол
- C. \*Фестал

- D. Но-шпу
- E. Папаверин

42. Ви берете участь в обстеженні пацієнта на хронічний панкреатит. Вкажіть, до якого обстеження його треба підготувати?

- A. Фіброгастроскопії
- B. Дуоденального зондування
- C. Холецистографії
- D. \*Аналізу сечі на діастазу
- E. Колоноскопії

43. Пацієнт госпіталізований з підозрою на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки. До якого додаткового методу обстеження необхідно медичній сестрі підготувати пацієнта?

- A. Ректороманоскопія
- B. \*Гастродуоденоскопія
- C. Колоноскопія
- D. Іригоскопія
- E. УЗД органів черевної порожнини

44. Найбільш інформативним методом діагностики хронічного гастриту є:

- A. \* Фіброгастродуоденоскопія
- B. Рентгенологічне дослідження шлунка
- C. Ультразвукове обстеження органів травлення
- D. Копрологічне дослідження
- E. –

45. Пацієнт з підозрою на хронічний гастрит знаходиться на обстеженні. Назвіть сучасний метод визначення секреторної функції шлунка:

- A. -
- B. Дуоденальне зондування
- C. \* Інтрагастральна Рн - метрія
- D. Фіброгастродуоденоскопія
- E. Копрологічне дослідження

46. Пацієнт скаржиться на відсутність апетиту, переважно до м'ясної їжі, відчуття тяжкості в надчеревній ділянці, нудоту, втрату маси тіла на 5 кг. Об'єктивно: блідість шкіри, пальпація надчеревної ділянки болісна. У калі позитивна реакція на приховану кров. До якого дослідження м/с повинна підготувати пацієнта?

- A. Дослідження промивних вод шлунка
- B. Рентгенологічне дослідження шлунка
- C. УЗД органів черевної порожнини
- D. \*Гастрофіброскопія з прицільною біопсією
- E. Комп'ютерна томографія шлунка

47. Хворий знаходиться на лікуванні у терапевтичному відділенні з діагнозом: “Гострий гастрит”. Яку з перерахованих проблем пацієнта можна вважати пріоритетною?
- A. \* Біль в епігастральній ділянці
  - B. Неприємний присмак у роті
  - C. Загальна слабкість
  - D. Біль голови
  - E. Відсутність апетиту
48. Хворий знаходиться на лікуванні у гастроентерологічному відділенні з діагнозом “Хронічний холецистит”. Яку з перерахованих проблем пацієнта можна вважати пріоритетною?
- A. \* Ниючий біль в правому підребер’ї
  - B. Дратівливість
  - C. Відрижка повітрям
  - D. Закрепи
  - E. –
49. Пацієнтка страждає хронічним гепатитом. Лікар призначив медикаментозне лікування. Які із призначених препаратів відносяться до гепатопротекторів?
- A. Тималін, тимоген
  - B. \* Карсіл, силібор
  - C. Преднізолон, дексаметазон
  - D. Рибоксин, кокарбоксілаза
  - E. Рифампіцин, метранідазол
50. У пацієнта з жовчнокам’яною хворобою виник інтенсивний біль у правому підребер’ї який іррадіює у праве плече, лопатку, нудота, повторне блювання. Це свідчить про:
- A. Гострий апендицит
  - B. Ниркову кольку
  - C. \* Печінкову кольку
  - D. Гострий панкреатит
  - E. Виразкову хворобу шлунка
51. Хворий 40 років скаржиться на нудоту, блювання, печію, відчуття важкості в епігастральній ділянці. Ознаками якого синдрому є вказані проблеми?
- A. \* Шлункової диспепсії
  - B. Кишкової диспепсії
  - C. Астено-вегетативний синдром
  - D. Інтоксикаційний синдром
  - E. Больовий синдром

52. У пацієнта підозра на жовчнокам'яну хворобу. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?

- A. \* УЗД
- B. Фіброгастродуоденоскопія
- C. Колоноскопія
- D. рН – метрія
- E. Іригоскопія

53. Хворому на виразкову хворобу шлунка призначено рентгеноскопію шлунка. Яку із контрастних речовин використовують?

- A. \* Барієву суміш
- B. Верографін
- C. Холевіт
- D. Іопогност
- E. Урографін

54. У пацієнта на рак шлунку в термінальній стадії скарги: біль у надчеревній ділянці, втрата апетиту, схуднення, загальна слабкість. Яка потенційна проблема може виникнути у пацієнта?

- A. Голодний біль
- B. Блювання, яке приносить полегшення
- C. \* Шлункова кровотеча
- D. Тенезми
- E. Оперізуючий біль у животі

55. Хворий скаржиться на тупий біль у надчеревній ділянці відразу після їди, бурчання та метеоризм, проноси. Який засіб використає медсестра за призначенням лікаря для усунення метеоризму?

- A. Но-шпу
- B. \* Активоване вугілля
- C. Папаверин
- D. Алохол
- E. Левоміцетин

56. Хворий скаржиться на неприємний присмак у ротовій порожнині, печію, нудоту, блювання, біль у надчеревній ділянці. Напередодні споживав недоброякісну їжу. Об'єктивно: язик обкладений сіро-білим нальотом. При пальпації – помірна розлита болючість у надчеревній ділянці. Що запідозрить медична сестра?

- A. Хронічний гастрит
- B. \* Гострий гастрит
- C. Печінкова коліка
- D. Виразкова хвороба шлунка
- E. Гострий панкреатит

57. До дільничного лікаря звернувся пацієнт. У нього виявлені такі проблеми: загальна слабкість, стомлюваність, зниження працездатності, зменшення апетиту, відраза до м'яса, відчуття тяжкості в надчеревній ділянці, втрата ваги 5 кг за місяць. При обстеженні: блідість та сухість шкіри. Для якого захворювання характерні дані ознаки?
- A. \*Раку шлунка
  - B. Виразкової хвороби шлунка
  - C. Хронічного гепатиту
  - D. Цирозу печінки
  - E. Хронічного гастриту
58. Пацієнтці 40 років, яка знаходиться у гастроентерологічному відділенні з підозрою на хронічний холецистит, призначено дослідження жовчного міхура. До якого медичного обстеження медсестра підготує пацієнтку?
- A. цистоскопії
  - B. колоноскопії
  - C. ФГДС
  - D. Іригоскопії
  - E. \*дуоденального зондування
59. Медсестра складає план догляду за пацієнтом на виразкову хворобу шлунка у період загострення. Які незалежні медсестринські втручання потрібно включати до плану?
- A. Промити шлунок
  - B. Застосувати анальгетики
  - C. Провести шлункове зондування
  - D. -
  - E. \*Провести бесіду про дотримання дієти
60. У відділення поступив пацієнт з підозрою на малігнізацію виразки шлунку. Які проблеми виявить медсестра при обстеженні?
- A. \*Зниження апетиту, відразу до м'яса
  - B. Підвищення АТ, збільшення ЧДР
  - C. Лихоманку, біль в попереку
  - D. Нудоту, зміну кольору сечі
  - E. Виразки на слизовій оболонці рота
61. У хворого Н., 27 р. з'явилися болі в епігастрії, що виникають через 1,5-2 год після прийому їжі, голодні, нічні болі, нудота. Яке захворювання можна за підозрити?
- A. Виразкову хворобу шлунка
  - B. Рак шлунка
  - C. \*Виразкову хворобу 12 - палої кишки
  - D. Панкреатит
  - E. Холецистит

- 62.** На лікуванні в терапевтичному відділенні знаходиться пацієнт зі скаргами на біль в гастродуоденальній ділянці через 2-3 год. після прийому їжі, періодичний “голодний” нічний біль. Який з препаратів застосовується для лікування пацієнта з данною патологією?
- A.** Панангін
  - B.** Дігосин
  - C.** \* Омепразол
  - D.** Анальгін
  - E.** Фестал
- 63.** В гастроентерологічному відділенні на лікуванні перебуває пацієнт з діагнозом хронічний холецистит. Лікар призначив пацієнтові жовчогінний препарат. Який препарат повинна приготувати медична сестра згідно листка призначення?
- A.** \* Холахол
  - B.** Анальгін
  - C.** Ампіцилін
  - D.** Баралгін
  - E.** Дігосин
- 64.** У Пацієнта 42, жовчо – кам’яна хвороба, яка проявилася печінковою колькою. До якого інструментального методу дослідження згідно з листком призначення має підготувати медична сестра пацієнта:
- A.** \* УЗД
  - B.** Гастроскопії
  - C.** Іригоскопії
  - D.** Колоноскопії
  - E.** Рентгенографії шлунка
- 65.** Пацієнтка 45 років скаржиться на періодичний ниючий біль у надчеревній ділянці, який з’являється через 40-60 хв після їди. Який медсестринський діагноз?
- A.** Пекучий біль
  - B.** Метеоризм
  - C.** \* Ранній біль
  - D.** Голодний біль
  - E.** Біль навколо пупка
- 66.** Медична сестра має провести бесіду серед пацієнтів гастроентерологічного відділення на тему: „Профілактика хронічних гастритів”. На яке питання їй слід звернути особливу увагу?
- A.** Споживання їжі, багатої на жири, вуглеводи
  - B.** поживання їжі, багатої на клітковину
  - C.** Надання переваги молочно-рослинній дієті

D. -

E. \*Дотримання режиму і вимог раціонального харчування

67.Пацієнт звернувся зі скаргами на біль в епігастральній ділянці. Із анамнезу відомо, що чотири години тому з'їв сумнівної якості м'ясо. Діагностовано гострий гастрит. Що в першу чергу повинна зробити медична сестра при реалізації четвертого етапу медсестринського процесу?

A. Заспокоїти пацієнта

B. Ввести знеболювальні препарати

C. \*Промити шлунок

D. Ввести адсорбуючі препарати

E. Ввести антибіотики

68.Яка дієта призначається хворому при хронічному панкреатиті ?

A. \*№ 5П

B. № 9

C. № 1

D. № 7

E. № 10

69.Основні клінічні синдроми виразкової хвороби дванадцятипалої кишки:

A. гіпертензивний, інтоксикаційний, больовий

B. набряковий, дизуричний, сечовий

C. інтоксикаційний, набряковий, анемічний

D. гіпертермічний, больовий, інтоксикаційний

E. \*астеновегетативний, больовий, диспептичний

70.Який з перелічених методів обстеження є найважливішим в діагностиці раку шлунка?

A. дослідження калу на приховану кров

B. дослідження шлункової секреції з гістаміном

C. \*гастродуоденоскопія з цитологічним дослідженням матеріалу

D. дослідження шлункової секреції за допомогою "Ацидотеста"

E. рентгенологічне дослідження

71.Хворому на хронічний гепатит призначають дієту:

A. \*№ 5

B. № 7

C. 10

D. № 9

E. № 1

72.В якому випадку спостерігається мелена?

A. -

B. Хронічний коліт

- C. \*Кровотеча з виразки шлунку Гастрит типу А
- D. Гемороїдальна кровотеча
- E. Хронічний гепатит

73. При запаленні жовчного міхура відмічаються патологічні зміни в порції жовчі:

- A. -
- B. Порції А
- C. Порції С
- D. Порції А і С
- E. \*Порції

74. Що є найчастішою причиною виникнення виразкової хвороби ?

- A. \*Хелікобактерія
- B. Спадковість
- C. Порушення харчування
- D. Астенічна конституція
- E. Зловживання алкоголю

75. Який симптом найбільш типовий для виразкової хвороби дванадцятипалої кишки?

- A. Відрижка повітрям, їжею, зригування
- B. \*Біль натще та через 1,5-3 год. після їди
- C. Нудота, блювання
- D. Блювання "кавовою гущею"
- E. Закрепи, метеоризм

76. Який з перелічених препаратів найбільш ефективний у при наданні невідкладної допомоги хворому з шлунково-кишковою кровотечею ?

- A. Вікасол
- B. \*Дицинон
- C. Хлористий кальцій
- D. Глюконат кальцію
- E. Аскорбінова кислота

77. На стаціонарне лікування поступила пацієнтка зі скаргами на інтенсивний біль у правому підребер'ї з іррадіацією в праву лопатку, ключицю, плече, нудоту та блювання, здуття живота, підвищену температуру, остуду. Яка з проблем є пріоритетною?

- A. Нудота, блювання
- B. \*Біль у правому підребер'ї
- C. Метеоризм
- D. Гіркота та сухість у роті
- E. Гарячка



**78.**Хвора, 39 років, скаржиться на гострий, “кинджальний” біль у животі, різку загальну слабкість. Захворіла раптово після фізичного навантаження. В анамнезі – виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. Під час огляду: обличчя бліде, шкіра вкрита холодним потом, живіт дошкоподібний. Яке ускладнення розвинулося у хворої?

- A.** \*Перфорація
- B.** Шлункова кровотеча
- C.** Пенетрація
- D.** Малігнізація
- E.** Пілоростеноз

**79.**Медична сестра, навчаючи пацієнта методиці тьюбажу (сліпого зондування), рекомендує вживати натще один із жовчогінних засобів:

- A.** Відвар подорожника
- B.** Відвар ромашки
- C.** Розчин кальцію хлориду
- D.** Розчин гідрокарбонату натрію
- E.** \*Мінеральну воду без газу

**80.**Пацієнтка перебуває на лікуванні в гастроентерологічному відділенні з приводу виразкової хвороби. Лікар призначив дослідження калу на приховану кров. Які харчові продукти необхідно виключити з раціону пацієнта з метою підготовки до дослідження?

- A.** Чорний хліб
- B.** Солодощі
- C.** Молоко
- D.** Каші
- E.** \*М'ясо

**81.**У пацієнта на цироз печінки розвинувся асцит. До якого втручання повинна підготувати пацієнта медична сестра?

- A.** \*Абдомінальна пункція
- B.** Стерильна пункція
- C.** Плевральна пункція
- D.** Люмбальна пункція
- E.** –

**82.**У пацієнта з жовчнокам'яною хворобою виник інтенсивний біль у правому підребер'ї, який іррадіює у праве плече, лопатку, нудота, повторне блювання. Це свідчить про:

- A.** \*Печінкову кольку
- B.** Гострий апендицит
- C.** Ниркову кольку
- D.** Гострий панкреатит
- E.** Виразкову хворобу шлунка

- 83.**Пацієнт скаржиться на тупий біль у правому підребер'ї, відчуття гіркоти в роті, схуднення. При огляді: "судинні" зірочки на грудях, печінкові долоні, "голова медузи" на передній стінці живота, асцит. Який патологічний стан імовірний у пацієнта?
- A.** Хронічний гастрит
  - B.** \*Цироз печінки
  - C.** Виразкова хвороба шлунка
  - D.** Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки
  - E.** Рак шлунка
- 84.**У відділення поступив пацієнт з підозрою на малігнізацію виразки шлунку. Які проблеми виявить медсестра при обстеженні?
- A.** Підвищення АТ, збільшення ЧДР
  - B.** Лихоманку, біль в попереку
  - C.** \*Зниження апетиту, відразу до м'яса
  - D.** Нудоту, зміну кольору сечі
  - E.** Виразки на слизовій оболонці рота
- 85.**Хворому з загостренням хронічного панкреатиту сестра медична повинна зібрати сечу:
- A.** На загальноклінічний аналіз сечі
  - B.** За Нечипоренком
  - C.** На бактеріологічне дослідження
  - D.** \*На діастазу
  - E.** За Зимницьким
- 86.**У пацієнта виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. Який основний медсестринський діагноз:
- A.** \*Голодний біль
  - B.** Ранній біль
  - C.** Біль довкола пупка
  - D.** "Кинджальний" біль
  - E.** Колькоподібний біль
- 87.**У пацієнта діагностовано хронічний панкреатит в стадії загострення. Лікар призначив повний голод. Скільки часу медична сестра має контролювати дотримання пацієнтом даної вимоги?
- A.** \*2-3 дні
  - B.** 6 год.
  - C.** 12 год.
  - D.** 24 год.
  - E.** 5-6 днів