

ПУЛЬМО

1. Флакон містить 1 000 000 ОД антибіотика. За призначенням лікаря медична сестра повинна ввести пацієнту 500 000 ОД даного антибіотика. Яку кількість розчинника необхідно взяти для розведення антибіотика, і яку кількість розчину треба ввести пацієнту?

- A. 5 мл розчинника і ввести 3 мл розчину
- B. *5 мл розчинника і ввести 2,5 мл розчину
- C. 10 мл розчинника і ввести 2, 5 мл розчину
- D. 5 мл розчинника і ввести 5 мл розчину
- E. 2, 5 мл розчинника і ввести 2, 5 мл розчину

2. Пацієнт 40-ка років лікується з приводу сухого плевриту. Турбують інтенсивні болі в правій половині грудної клітки. Яке положення в ліжку слід порадити пацієнту для зменшення болю?

- A. На лівому боці
- B. З припіднятими ногами
- C. На спині з припіднятим головним кінцем ліжка
- D. З припіднятим головним кінцем ліжка
- E. *На правому боці

3. Пацієнт 60 років хворіє на хронічне обструктивне захворювання легень протягом 7-ми років. Турбують періодичне підвищення температури тіла, кашель із слизово-гнійним харкотинням, задишка. Яка проблема є провідною?

- A. Сухий кашель
- B. Біль в грудній клітці
- C. Підвищення температури тіла
- D. *Експіраторна задишка
- E. Інспіраторна задишка

4. Ви - сімейна медсестра, здійснюєте догляд за пацієнтом з гострим бронхітом. Лікар призначив відхаркувальний та бронхолітичний препарати. Який найдоцільніший шлях введення даних лікарських засобів?

- A. Внутрішньом'язево
- B. Ендотрахеально
- C. *Перорально
- D. Сублінгвально
- E. Ректально

5. При обстеженні у хворого виявили "склоподібне" харкотиння, а також наявність у мокротинні спіралей Куршмана, кристалів Шарко- Лейдена. Для якого захворювання характерні дані зміни?

- A. Пневмонія
- B. *Бронхіальна астма
- C. Абсцес легенів

Д. Гострий бронхіт
Е. Гангрена легенів

6. Пацієнт 42-х років звернувся до чергової медичної сестри онкологічного диспансеру з такими проблемами: кашель з виділенням яскраво-червоної крові, запаморочення. Який препарат підготує медсестра для надання допомоги?

- А. Дипіридамол
- В. *Дицинон
- С. Диклофенак
- Д. Димедрол
- Е. Дилтіазем

7. Ви – медсестра міської поліклініки, проводите обстеження пацієнта з хронічним бронхітом. Яку медичну документацію слід заповнити на диспансерного хворого?

- А. Медичну карту амбулаторного хворого (ф. 025/о)
- В. Термінове повідомлення про інфекційне захворювання (ф. 058/о)
- С. *Контрольну карту диспансерного спостереження (ф. 030/о)
- Д. Статистичний талон (ф. 025-2/о)
- Е. Статистичну карту вибулого зі стаціонару (ф. 066/о)

8. Пацієнтка Р. 52 років лікується в пульмонологічному відділенні з приводу бронхіальної астми, скаржиться на порушення дихання: вдих короткий, а видих утруднений і дуже тривалий. Як називається таке порушення дихання?

- А. Змішана задишка
- В. Дихання Біота
- С. Стридорозне дихання
- Д. *Експіраторна задишка
- Е. Інспіраторна задишка

9. Хворого на хронічний бронхіт останніми місяцями турбує виділення гнійного харкотиння з неприємним запахом вранці (до 200 мл). Пальці мають вигляд "барабанних паличок", нігті - "годинникових скелець". Для якого захворювання це характерно?

- А. Туберкульоз
- В. Пневмонія
- С. Пневмоконіоз
- Д. *Бронхоектатична хвороба
- Е. Плеврит

10. Медична сестра пульмонологічного відділення здійснює медсестринський процес у хворого з гарячкою. III етап медсестринського процесу вона документує у:

- А. Історію хвороби
- В. Карту спостереження за хворим

- С.*План догляду за пацієнтом**
- Д.Листок оцінки якості догляду**
- Е.Листок медсестринського обстеження пацієнта**

11. Хворий 60-ти років знаходиться на лікуванні в пульмонологічному відділенні. Раптово стан хворого погіршився у зв'язку з легеневою кровотечею. Якого положення слід надати пацієнту?

- А.Підвищеного положення і повернути його на протилежний бік враження**
- В.Покласти на спину і підняти головний кінець**
- С.Покласти на живіт і підняти нижній кінець**
- Д.Покласти на бік і зігнути ноги в колінних суглобах**
- Е.*Підвищеного положення і повернути на уражений бік**

12. На стаціонарному лікуванні перебуває пацієнт 33-х років з приводу бронхіальної астми. Яке медсестринське втручання необхідно здійснити у разі нападу бронхіальної астми?

- А.Заспокоїти пацієнта, поставити міхур з льодом на грудну клітку**
- В.Заспокоїти пацієнта, провести лужну інгаляцію**
- С.Заспокоїти пацієнта, дати відхаркувальну мікстуру**
- Д.*Заспокоїти пацієнта, застосувати інгаляційно сальбутамол**
- Е.Заспокоїти пацієнта, дати зволожений кисень**

13. Хворий скаржиться на вологий кашель, підвищення температури до 39°C, нездужання, біль у грудній клітці, задишку під час фізичного навантаження. У крові: лейкоцитоз, прискорена ШОЕ. Під час аускультатії дрібно пухирчасті хрипи, крепітація, жорстке дихання. На Ro-грамі вогнищеві інфільтративні тіні в легенях. Що слід запідозрити у хворого?

- А.Бронхіальна астма**
- В.Бронхіт**
- С.*Вогнищева пневмонія**
- Д.Гострий обструктивний бронхіт**
- Е.Стенозуючий ларингіт**

14. Дільнична медсестра проводить специфічну профілактику туберкульозу. Що входить в поняття специфічної профілактики туберкульозу?

- А.Подвірні обходи**
- В.Флюорографічне обстеження населення**
- С.Проведення проби Манту**
- Д.*Вакцинація і ревакцинація БЦЖ та хіміопрфілактика**
- Е.Санітарно-просвітня робота в осередку туберкульозу**

15. При проведенні медсестринського обстеження хворого медична сестра виявила наступні скарги: біль в грудній клітці, кашель з виділенням "іржавого" харкотиння, підвищення 39°C. температури тіла до Яке захворювання може запідозрити медсестра у хворого?

- A. Абсцес легень**
- B. Бронхіт**
- C. Ларингіт**
- D. Фарингіт**
- E. *Пневмонія**

16. У пацієнта діагностовано рак легенів. Яке харкотиння є характерним для цього захворювання?

- A. Ржаве**
- B. Скловидне**
- C. * Малинове желе**
- D. Слизисто-гнійне**
- E. Кров'янисте**

17. Пацієнт знаходиться на лікуванні у терапевтичному відділенні з підозрою на пухлину легень. До якого ендоскопічного обстеження медсестра підготує пацієнта:

- A. *Бронхоскопії**
- B. Ірігоскопії**
- C. Колоноскопії**
- D. Урографії**
- E. Фіброезофагодуоденоскопії з прицільною біопсією**

18. Хвора 41 р., скаржиться на підвищення температури до 39,5°C, кашель з виділенням “іржавого” харкотиння, задишку, біль у правій половині грудної клітки, що посилюється під час дихання. Чим обумовлений біль у грудній клітці пацієнта?

- A. *Ураженням плевральних листків**
- B. Підвищенням тиску в малому колі кровообігу**
- C. Частим кашлем**
- D. Гіпоксією дихальних м'язів**
- E. Обструкцією бронхіального дерева**

19. У хворого Н. 62 років запідозрили рак легенів. Наявність яких клітин в мокротинні характерне для цього захворювання?

- A. лейкоцитів**
- B. еозинофілів**
- C. * атипових клітин**
- D. тромбоцитів**
- E. еритроцитів**

20. У хворого 48 р., що лікується з приводу “бронхіальної астми” з'явився кашель, ядуха. Яку до лікарську допомогу слід надати пацієнту?

- A. * Зробити інгаляцію з портативного інгалятора**
- B. Ввести підшкірно розчин ефедрину**

- C. Ввести підшкірно розчин адреналіну
- D. Ввести внутрішньовенно розчин еуфіліну
- E. Ввести внутрішньовенно розчин преднізолону

21. В терапевтичне відділення поступив пацієнт на сухий плеврит. Яка його основна проблема?

- A. Експіраторна задишка
- B. Склоподібне мокротиння
- C. Вологий кашель
- D. Кровохаркання
- E. *Біль в грудній клітці при диханні

22. До сімейної медичної сестри звернувся пацієнт зі скаргами на виражену задишку із утрудненим видихом, кашель нападаподібний з виділенням тягучого склоподібного мокротиння. Яка основна проблема пацієнта?

- A. Сухий кашель
- B. *Виражена задишка із утрудненим видихом
- C. Кровохаркання
- D. Біль у грудній клітці
- E. Виділення мокротиння

23. У хворого 70 років бронхіальна астма. Почався напад експіраторної задишки. Яке положення медична сестра надасть хворому?

- A. Дренажне положення
- B. Покладе горизонтально
- C. Покладе з підвищеним головним кінцем тіла
- D. *Посадить з опорою на руки
- E. Зафіксує в ліжку

24. Який лікарський засіб можна прийняти пацієнту з нападом бронхіальної астми?

- A. *Сальбутамол
- B. Ізоніазид
- C. Дроперидол
- D. Новокаїн
- E. Глюконат кальцію

25. Який характер кашлю визначає медсестра у пацієнта із сухим плевритом?

- A. *Сухий болісний
- B. Вологий
- C. Із виділенням "іржавого" харкотиння
- D. Із гнійним харкотинням
- E. Кашель відсутній

26. Пацієнт 42 років поскаржився медсестрі, що він кашляє та виділяє харкотиння 3 місяці поспіль протягом 2-х років. Про яке захворювання можна подумати в даному випадку?

- А. Гострий бронхіт
- В. Крупозна пневмонія
- С.* Хронічний бронхіт
- Д. Ексудативний плеврит
- Е. Абсцес легенів

27. У хворого пневмонія. Температура тіла за 1 годину знизилась з 39 до 36,6°C. Яке ускладнення може бути при цьому?

- А.* Колапс
- В. Легенева кровотеча
- С. набряк легенів
- Д. Непритомність
- Е. Серцева астма

28. У пацієнта виражена задишка. При обстеженні діагностували наявність рідини в плевральній порожнині. До якого втручання повинна підготувати пацієнта медична сестра?

- А. Абдомінальна пункція
- В. Стернальна пункція
- С. Бронхоскопія
- Д.* Плевральна пункція
- Е. Бронхографія

29. Одним із ранніх симптомів центрального раку легень є:

- А. Кровохаркання
- В. Біль у грудній клітці
- С.* Надсадний, гавкаючий кашель
- Д. Задишка
- Е. Підвищення температури тіла

30. Як називається положення пацієнта під час нападу ядухи при бронхіальній астмі?

- А. Активне
- В. Пасивне
- С.* Вимушене
- Д. Положення Сімса
- Е. Положення Фаулера

31. Пацієнта турбують напади нічного кашлю з незначною кількістю харкотиння, напади ядухи, відчуття стискання в грудях. Об'єктивно: ціаноз шкіри. Вимушене положення сидячи, опираючись руками на край ліжка, грудна

клітка бочкоподібна. Яка проблема буде пріоритетною у пацієнта на бронхіальну астму?

- A. Кашель
- B. * Напад ядухи
- C. Кровохаркання
- D. Пітливість
- E. Біль у грудній клітці

32. Пацієнт 60 років хворіє на хронічне обструктивне захворювання легень протягом 7-и років. Турбують періодичне підвищення температури тіла, кашель із слизово-гнійним харкотинням, задишка. Яка проблема є провідною?

- A. Інспіраторна задишка
- B. * Експіраторна задишка
- C. Біль в грудній клітці
- D. Сухий кашель
- E. Підвищення температури тіла

33. На яку тему медичній сестрі, в першу чергу, слід провести бесіду серед хворих на хронічний бронхіт?

- A. Про раціональне харчування
- B. Про рухову активність
- C. * Про шкідливість паління
- D. Про шкідливість алкоголю
- E. Про запобігання стресів

34. До якого дослідження харкотиння слід підготувати пацієнта з раком легенів?

- A. Харкотиння на БК
- B. Загальний аналіз харкотиння
- C. Харкотиння на мікрофлору
- D. * Харкотиння на атипові клітини
- E. Харкотиння на пневмоцисти

35. Яке положення слід надати пацієнту з ексудативним плевритом під час виконання плевральної пункції?

- A. * Посадити обличчям до спинки стільця в позі "вершника"
- B. Посадити спиною до спинки стільця
- C. Покласти в ліжку на правий бік
- D. Покласти в ліжку на лівий бік
- E. Покласти в ліжку на живіт

36. Які ознаки кровотечі вказують на її легеневого походження :

- A. кров темна , вигляду „кавової гущі „
- B. кров темна, виділяється при блюванні
- C. кров, яка виділяється, має кислу реакцію

D. -

E. * кров яскраво-червона, піниста

37. Ви проводите оцінку результату проби Манту. Результат вважається позитивним, якщо інфільтрат більше:

A. *5 мм

B. 2 мм

C. 1 мм

D. 3 мм

E. 4 мм

38. При догляді за пацієнтом з пневмонією у першому періоді лихоманки необхідно:

A. покласти міхур з льодом на чоло

B. * тепло вкрити, до кінцівок прикласти грілки

C. розкрити пацієнта

D. дати прохолодні напої

E. часто змінювати натільну білизну

39. При якому захворюванні легень необхідно створення дренажного положення хворому:

A. *Бронхоектатична хвороба

B. Туберкульоз легенів

C. Бронхіальна астма

D. Рак легенів

E. Пневмонія

40. Пацієнта на рак легенів тривало турбує кашель з мокротинням, кровохаркання, слабкість, запаморочення. Яка потенційна проблема може виникнути?

A. *Легенева кровотеча

B. М'язова слабкість

C. Блідість шкіри

D. Приступ ядухи

E. Головний біль

41. На яку основну проблему пацієнта повинна звернути увагу медична сестра при догляді за хворим з сухим плевритом?

A. Герпетичні висипи на губах

B. Кашель з великою кількістю гнійного харкотиння

C. Задишку

D. *Біль у грудній клітці, який посилюється при глибокому диханні та кашлі

E. Кров'янисте харкотиння

42. За якої умови біль у разі сухого плевриту посилюється:

- A. *під час глибокого дихання, кашлю
- B. у положенні хворого на животі
- C. у положенні хворого на спині
- D. у положенні хворого ортопноє
- E. при високій температурі тіла

43. Назвіть основне джерело туберкульозної інфекції:

- A. пацієнт, хворий на закриту форму туберкульозу
- B. корова, хвора на туберкульоз
- C. *пацієнт, хворий на відкриту форму туберкульозу
- D. вівця, хвора на туберкульоз
- E. голуб, хворий на туберкульоз

44. У пацієнта, який лікується з приводу бронхоектатичної хвороби, виявлені такі симптоми: слабкість, пітливість, субфебрильна температура, кашель із виділенням гнійного мокротиння до 100 мл на добу, особливо зранку. Що виявить медична сестра при загальному огляді пацієнта?

- A. Серцевий горб
- B. Наявність висипу на шкірі
- C. Дихання Куссмауля
- D. *Пальці у вигляді “барабанних паличок”
- E. Виразки слизових оболонок

45. Пацієнт, що лікується з приводу абсцесу легень, скаржиться на головний біль, слабкість, $t^{\circ} 38,6^{\circ} C$, задишку, виділення великої кількості харкотиння. Який з вказаних симптомів свідчить про II період розвитку абсцесу?

- A. Різким підвищенням температури тіла, погіршенням стану
- B. Виділенням невеликої кількості слизисто-гнійного харкотиння
- C. Виділенням невеликої кількості “іржавого” харкотиння
- D. Кашлем з виділенням невеликої кількості в’язкого, склоподібного харкотиння
- E. *Виділенням великої кількості зловонного харкотиння

46. До загальних симптомів туберкульозу легенів належать:

- A. *Тривала лихоманка, нічна пітливість, швидка втомлюваність
- B. Кашель протягом одного місяця, часті застуди, виділення харкотиння
- C. Напади експіраторної задишки, кашель з виділенням в’язкого харкотиння
- D. Гектична лихоманка, інспіраторна задишка, біль в грудній клітці
- E. Кашель з виділенням харкотиння повним ротом, загальна слабкість

47. Показанням для дослідження харкотиння на атипіві клітини є підозра на:

- A. *Рак легенів
- B. Абсцес легенів
- C. Пневмонію
- D. Бронхіт
- E. Бронхіальну астму

48. Який основний симптом характерний для бронхіальної астми:

- A. Кашель сухий
- B. *Напад ядухи
- C. Кашель з виділенням харкотиння
- D. Біль у грудній клітці
- E. Підвищення температури

49. Для II періоду абсцесу легенів найбільш характерно:

- A. Гарячка
- B. *Виділення харкотиння "повним ротом"
- C. Задишка
- D. Кашель
- E. Біль в грудній клітці

50. Жінка 30 років, яка хворіє бронхіальною астмою, дізналась про можливість самоконтролю прохідності бронхів за допомогою приладу індивідуального користування, який можна використовувати в домашніх умовах, але не знає як ним користуватися. Якому методу діагностики навчить жінку медична сестра?

- A. *Пікфлоуметрії
- B. Пневмотахометрії
- C. Спірометрії
- D. РН-метрії
- E. Визначення ЖЄЛ

51. Який метод профілактичного обстеження населення використовується для ранньої діагностики туберкульозу та онкопатології?

- A. * Флюорографія
- B. Бронхоскопія
- C. Бронхографія
- D. Спірографія
- E. -

52. Пацієнт 45 років лікується в стаціонарі з приводу ексудативного плевриту.

Вкажіть основні скарги хворого:

- A. кашель з харкотинням
- B. клекочуче дихання
- C. біль голови
- D. ядуха
- E. * наростаюча задишка

53. Хворий звернувся із скаргою на кровохаркання впродовж тривалого часу. Яке захворювання слід запідозрити?

- A. *Рак легенів
- B. Хронічний бронхіт

- C. Ексудативний плеврит
- D. Бронхіальну астму
- E. Вогнищеву пневмонію

54. Медична сестра проводить санітарно-просвітню роботу з приводу виникнення захворювання на туберкульоз легенів. Який мікроорганізм викликає це захворювання?

- A. *Палочка Коха
- B. Гемолітичний стафілокок
- C. Пневмокок
- D. Біла спірохета
- E. Гонокок

55. Медична сестра у школі провела пробу Манту. Через який проміжок часу оцінюється проба Манту у пацієнта:

- A. 48 год
- B. 20-30 хв.
- C. 1 год.
- D. 24 год.
- E. *72 год

56. Пацієнт скаржиться на постійний кашель (більш зранку), з виділенням великої кількості харкотиння (до 200 мл) гнійного характеру іноді $t^{\circ} - 37,8^{\circ}\text{C}$; ЧД – 24/хв. Яке дослідження є найефективнішим для уточнення діагнозу?

- A. Флюорографія
- B. Спірометрія
- C. *Бронхографія
- D. Рентгеноскопія грудної клітки
- E. Загальний аналіз мокротиння

57. Який метод обстеження дозволяє виявити у хворого на виразкову хворобу хелікобактерну інфекцію?

- A. Ph - метрія
- B. Томографія
- C. *Дихальний тест
- D. Фракційне дослідження секреції шлунка
- E. Копрологічне дослідження

58. У пацієнта бронхоектатична хвороба. Яку пораду повинна дати медична сестра пацієнту для кращого відходження харкотиння?

- A. Займати високе положення Фаулера
- B. Займати середнє положення Фаулера
- C. Займати низьке положення Фаулера
- D. *Займати дренажне положення
- E. Займати положення Сімса

59.Пацієнта турбують напади нічного кашлю з незначною кількістю харкотиння, напади ядухи, відчуття стискання в грудях. Об'єктивно: ціаноз шкіри. Вимушене положення сидячи, опираючись руками на край ліжка, грудна клітка бочкоподібна. Яка проблема буде пріоритетною у пацієнта на бронхіальну астму?

- A.** Кашель
- B.** Кровохаркання
- C.** Пітливість
- D.** *Напад ядухи
- E.** Біль у грудній клітці