Крок М Акушерська справа
6.0 Загальний догляд за хворими

1 У вагітної нефропатія другої половини вагітності. Вкажіть, яка дієта доцільна при даній патології:
A *7
B 10
C 11
D 9
E 8

2 Вкажіть, який із методів дослідження не відноситься до ендоскопічних:
A *Іригоскопія
B Цистоскопія
C Бронхоскопія
D Ректороманоскопія
E Колоноскопія

3 До стаціонару на лікування поступає вагітна з терміном вагітності 18 тижнів. Вкажіть, який документ повинна заповнити акушерка:
A *Медична картка стаціонарного хворого
B Історія пологів
C Обмінна карта вагітності
D Статистичний талон
E Листок лікарських призначень

4 Акушерка проводить туалет зовнішніх статевих органів породіллі за допомогою (корнцанга із серветкою). Вкажіть, який із антисептичних розчинів вона використає:
A *Розчин калію перманганату 1:10000
B 40% етилового спирту
C 3% розчин пероксиду водню
D Перевареною водою
E Дистильованю водою

5 Вкажіть режим стерилізації медичного інструментарію повітряним методом:
A *180° - 60 хв.
B 180° - 30 хв.
C 160° - 130 хв.
D 180° - 45 хв.
E 160° - 60 хв.

6 У породіллі протягом тижня відмічались добові коливання температури в межах 4-5°*C*. Визначте тип гарячки:
A *Гектична
B Постійна
C Хвилеподібна
D Поворотна
E Інтермітуюча

7 У приймальне відділення поступила вагітна з педикульозом. Вкажіть, який протипедикульозний засіб ви застосуєте:
A *Механічний метод
B Карбофос

C Мильно-сольвентова емульсія
D Сірчана мазь
E Оцтова кислота

8 Після введненя антибіотика у пацієнтки відмічається свербіж, почервоніння, набряк в місці ін'єкції. Вкажіть, який стан виник в пацієнтки:
A *Алергічна реакція
B Медикаминтозна емболія
C Інфільтрат
D Некроз тканин
E Пірогенна реакція

9 В пацієнтки, яка знаходиться на ліжковому режимі, спостерігається стійка гіперемія та часткове відшарування шкіри попереково-крижової ділянки. Дайте оцінку пролежня:
A *II-й ступінь
B I-й ступінь
C V-й ступінь
D IV-й ступінь
E III-й ступінь

10 За наявності в пацієнтки алергічних реакцій для стимуляції секреції шлунка необхідно призначити такий засіб:
A *Пентагастрин
B Дімедрол
C Гістамін
D Кофеїн
E Магнію сульфат

11 Акушерка жіночої консультації роз'яснює жінці правила вимірювання базальної температури. На яку довжину треба ввести термометр в пряму кишку?
A *3-4 см
B 5-6 см
C 7-8 см
D 1-2 см
E 4-5 см

12 В пологовому будинку знаходиться жінка після кесарського розтину на ліжковому режимі. Одягати сорочку пацієнтці треба в такій послідовності:
A *Одягати спочатку на руки, потім на голову
B Одягати спочатку на голову, потім на руки
C По бажанню пацієнтки
D Як зручніше медперсоналу
E Одночасне одягання рук і голови

13 В гінекологічному відділенні знаходиться жінка після операції з приводу позаматкової вагітності. Що необхідно застосувати з метою профілактики кровотечі?
A *Міхур з льодом
B Холодний компрес
C Холодну примочку
D Грілку
E Сухе тепло

14 Породіллі акушерка приклала на живіт міхур з льодом. Через який час вона повинна його зняти?
A *Через 20-30 хв.
B Через 10-15 хв.
C Через годину
D Доти, поки не розтане лід
E Через 5-10 хв.

15 У породіллі, 25-ти років, після кесарського розтину виникла затримка сечі понад 6 годин. Які заходи слід застосувати в першу чергу?
A *Рефлекторно викликати акт сечовиділення
B Промити сечовий міхур
C Ввести лікарські засоби у сечовий міхур
D Поставити гірчичники на гомілки
E Поставити холодний компрес на гомілки

16 Ви акушерка ФАПу, вночі Вас покликали до пацієнтки з бронхіальною астмою у якої виникли відчуття нестачі повітря, задишка. Об'єктивно: положення сидяче, опираючись руками на стілець. Вкажіть шлях введення 5 мл 2% розчину еуфіліну:
A *Внутрішньовенно
B Внутрішньом'язово
C Внутрішньоартеріально
D Підшкірно
E Внутрішньошкірно

17 Акушерка жіночої консультації пояснює вагітній жінці, що після ретельного туалету зовнішніх статевих органів, вона повинна зібрати середню порцію сечі в чисту, суху банку. Вкажіть метод дослідження сечі:
A *За методом Нечипоренко
B Сеча на цукор
C Сеча на діастазу
D За методом Зимницького
E За методом Амбурже

18 Пацієнтці, яка знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу "загрози переривання вагітності", лікар призначив дослідження сечі за методом Зимницького. Вкажіть мету даного дослідження:
A *Дослідження видільної і концентраційної функції нирок
B Визначення кількості форменних елементів в осаді сечі
C Визначення амілази
D Визначення цукру в сечі
E Визначення добового діурезу

19 Породіллі з цукровим діабетом призначено введення 20 ОД інсуліну. У вас флакони по 100 ОД інсуліну в 1 мл. Скільки мл інсуліну необхідно набрати в шприц 2 мл?
A *0,2 мл
B 0,5 мл
C 0,4 мл
D 1 мл
E 2 мл

20 Ви акушерка гінекологічного відділення. Хворій 45-ти років після операції з приводу

фіброміоми матки призначено підшкірне введення 1 мл 1% розчину промедолу. В якому документі реєструється введення призначеного препарату?
A *Журналі обліку наркотичних засобів
B Журналі передачі чергування
C Стаціонарному журналі
D Медичній карті стаціонарного хворого
E Журналі поступаючих хворих

21 У породіллі, в післяопераційному періоді виник закреп. Лікар призначив пацієнтці олійну клізму. Вкажіть кількість олійного розчину та температуру:
A *150-200 мл, 37-38°*C*
B 50-100 мл, 40-42°*C*
C 100-150 мл, 30-35°*C*
D 150 мл, 34-35°*C*
E 500 мл, 20-30°*C*

22 Породілля не може здійснити акт сечовиділення протягом 12-ти годин. Рефлекторні дії не дали бажаного єфекту. Яку першочергову допомогу необхідно надати жінці?
A *Здійснити катетеризацію сечового міхура
B Покласти грілку на низ живота
C Дати тепле питво
D Ввести постійний катетер
E Ввести спазмолітики

23 Під час огляду вагітної, акушерка виявила у жінки педикульоз. Який засіб необхідно застосувати для проведення обробки?
A *0,25% емульсія декрезилу
B Шампунь “Педикулін”
C Лосьйон “Ланцид”
D Оцтова кислота
E 0,15% емульсія карбофосу

24 Під час приймання пологів в око акушерці потрапила навколоплідна вода. Які подальші дії акушерки?
A *Промити око проточною водою
B Закрапати око розчином борної кислоти
C Промити око дистильованою водою
D Промити око блідо-рожевим розчином калію перманганату
E Закрапати око відваром ромашки

25 Акушерка полового залу розпочала використовувати в своїй роботі стерильну білизну з бікса. Вкажіть, протягом якого часу зберігається стерильність матеріалу в даному біксі?
A *6 годин
B 10 годин
C 12 годин
D 24 години
E 48 годин

26 Жінці необхідно здійснити туалет зовнішніх статевих органів. Вкажіть, який інструмент повинна підготувати акушерка:
A *Корнцанг
B Голкоутримувач

C Затискач Кохера
D Цапки для білизни
E Жолобоподібний зонд

27 Після вимірювання температури хворим, акушерка здійснює дезінфекцію медичних термометрів. Вкажіть, який дезінфікуючий розчин використає акушерка:
A *0,2% дезактин
B 5% розчин хлорного вапна
C 33% розчин перекису водню
D 0,3% хлораміну
E 0,5% хлоргекседин

28 Хворій гінекологічного відділення лікар призначив щогодини визначати пульс. Які властивості пульсу повинна визначити акушерка?
A *Частоту, ритм, наповнення, напруження
B Частоту, напруження, висоту
C Пульсові коливання, наповнення
D Ритм, швидкість, висоту,
E Швидкість, наповнення

29 Породіллі одразу після пологів акушерка приклала на низ живота міхур з льодом. Через який час вона повинна його зняти?
A *Через 30 хв.
B Доки, поки не розтане лід
C Через 10 хв.
D Через годину
E Через 20 хв.

30 У вагітної 36 неділь після вимірювання артеріального тиску, акушерка ФАПу, відмічає зміни показників артеріального тиску. Вкажіть показники артеріальної гіпертензії:
A *140/90 мм рт.ст.
B 100/50 мм рт.ст.
C 110/60 мм рт.ст.
D 120/70 мм рт.ст.
E 130/80 мм рт.ст.

31 Вагітній з набряковим синдромом лікар призначив визначення водного балансу.Що необхідно врахувати для цього акушерці?
A *Кількість вживаної рідини й виділеної сечі за добу
B Кількість виділеної сечі за добу
C Кількість виділеної сечі за день
D Кількість виділеної сечі за ніч
E Кількість виділеної сечі за кожні 3 години

32 Хворій на цукровий діабет потрібно ввести за допомогою шприца ємкістю 2 мл 24 МО інсуліну (1 мл інсуліну містить 40 МО). Скільки інсуліну необхідно набрати в шприц?
A *0,6 мл
B 0,1 мл
C 0,2 мл
D 0,3 мл
E 0,5 мл

33 Породіллі призначено промивання сечового міхура. Скільки дезінфікуючого розчину повинна ввести акушерка під час промивання?
A *200-300 мл
B 100-200 мл
C 400-500 мл
D 500-600 мл
E 900-1000 мл

34 Після пологів пацієнтці з гострою затримкою сечі лікар призначив катетеризацію сечового міхура. Чим повинна обробити катетер акушерка перед введенням його в сечівник?
A *Стерильним гліцерином
B Розчином фурациліну
C Розчином натрію хлориду
D Антисептичним розчином
E Рідким вазеліном

35У пацієнтки 30-ти років, яка знаходиться на лікуванні в гінекологічному відділенні, гостра затримка сечі. Рефлекторні дії не дали бажаного ефекту. Вкажіть подальші дії акушерки:
A *Здійснити катетеризацію сечового міхура
B Промити сечовий міхур
C Дати тепле пиття
D Покласти грілку на низ живота
E Ввести постійний катетер

36Породіллі після пологів лікар призначив внутрішньом'язові ін'єкції олійного розчину. Акушерка перед набиранням розчину в шприц не підігріла його. На 3-й день в місці ін'єкції утворилось ущільнення і біль при пальпації. Вкажіть, яке ускладнення виникло після ін'єкції:
A *Інфільтрат
B Некроз
C Медикаментозна емболія
D Алергійна реакція
E Гематома

37 У жінки після пологів виник стійкий закреп. Вкажіть, яку клізму використає акушерка за призначенням лікаря?
A *Олійну
B Очисну
C Сифонну
D Живильну
E Краплинну

38 У пацієнтки з вадою серця, лікар призначив акушерці підрахувати кількість дихальних рухів. Частота дихання становить 30/хв. Вкажіть, що спострерігається у пацієнтки:
A *Тахіпное
B Брадипное
C Апное
D Диспное
E Ядуха

39 В приймальне відділення лікарні прибула вагітна для планової госпіталізації. Пацієнтка потребує санітарної обробки. Вкажіть, вид санітарної обробки:
A *Повна (душ)
B Повна (гігієнічна ванна)
C Часткова(обтирання)
D Спеціальна
E Відмова від санітарної обробки

40 Пацієнтка 26-ти років, яка знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні з загостренням ревматизму скаржиться на приступи серцебиття. Лікар призначив контролювати пульс. Вкажіть судину, яку найчастіше використовують для дослідження пульсу:
A *Променева артерія
B Стегнову артерія
C Скроневу артерія
D Підколінна артерія
E Сонна артерія

41 Підчас внутрішньовенної ін'єкції акушерка випадково ввела 10% розчин хлористого кальцію під шкіру. Які подальші дії акушерки?
A *Припинити введення, обколоти місце ін'єкції 0,1% розчином адреналіну
B Накласти джгут вище місця ін'єкції
C В місце ін'єкції ввести 0,9% розчин натрію хлориду 5-8 мл
D Покласти грілку
E Продовжити введення 10% розчину кальцію хлориду

42 Метод дезінфекції, який включає в себе використання дії високих і низьких температур, променевих засобів та механічний вплив називається:
A *Фізичний
B Хімічний
C Механічний
D Спеціальний
E Загальний

43 Для якого рентгенологічного дослідження готують контрастну суміш, яка складається із сульфату барію (із розрахунку 400 г порошку на 1,6 л води) і 10 г таніну?
A *Іригоскопії
B Урографії ретроградна
C Холецистографії
D Бронхографії
E Урографії екскреторна

44 При проведенні санітарного оброблення хворих на педикульоз потрібно користуватись наказом МОЗ України від 28.07.1994 р. "Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом". Вкажіть номер чинного наказу:
A *38
B 120
C 365
D 408
E 720

45 Окремо в скількох примірниках старша акушерка виписує готові, екстемпоральні

лікарські форми, перев'язувальний матеріал та предмети догляду за хворими?
A *В трьох
B В одному
C В двох
D В чотирьох
E В п'яти

46 Після припинення внутрішньовенного уведення розчину, акушерка накладає на місце ін'єкції стерильний ватний тампон, видаляє голку із вени, місце ін'єкції притискає на 5 хв. Для попередження, якого ускладнення виконуються дані дії акушеркою?
A *Гематоми
B Інфільтрату
C Повітряної емболії
D Непритомності
E Пірогенної реакції

47 В якій кількості закрапують в око розчин антибіотика другого розведення для проведення кон'юктивальної проби?
A *1-2 краплі
B 3-4 краплі
C 4-5 краплі
D 5-6 крапель
E 6-8 крапель

48 Пацієнтці з підозрою на шлункову-кишкову кровотечу призначено дослідження калу на приховану кров. Вкажіть, яку кількість калу необхідно взяти для дослідження:
A *5-10 г калу
B 1-3 г калу
C 3-4 г калу
D 11-15 г калу
E 15-20 г калу

49 Перед набиранням олійного розчину у шприц, акушерка підігріває на водяній бані ампулу до температури:
A *36-37°*C*
B 39-40°*C*
C 34-36°*C*
D 25-30°*C*
E 20-25°*C*

50 Для приготування 1 л 0,2% розчину дезактину необхідно взяти сухої речовини:
A *2 г
B 10 г
C 15 г
D 20 г
E 50 г

51 Зазначте тривалість стерилізації під тиском 2 атм при температурі 132°*C*:
A *20 хв.
B 15 хв.
C 45 хв.
D 60 хв.

E 120 хв.

52 Пацієнтці з підозрою на туберкульоз, лікар призначив дослідження харкотиння на мікобактерії. Вкажіть, протягом якого часу необхідно збирати харкотиння:
A *1-3 доби
B 10 діб
C Будь-який час
D За 3 год
E Одноразово вранці

53 Пацієнтці для знеболення призначені наркотичні анальгетики. Вкажіть, як часто старша акушерка виписує наркотичні препарати:
A *1 раз на 3 дні
B Щодня
C 1 раз на тиждень
D 1 раз на 10 днів
E 1 раз на місяць

54 Для графічного запису показників артеріального тиску акушерка використовує температурний листок.Вкажіть ціну поділки артеріального тиску:
A *5 мм рт.ст.
B 1 мм рт.ст.
C 2 мм рт.ст.
D 3 мм рт.ст.
E 4 мм рт.ст.

55 В приймальне відділення лікарні доправленно пацієнтку з блюванням “кавовою гущею”. Вкажіть вид транспортування у відділення:
A *На каталці-ношах
B На кріслі-каталці
C Ліфтом
D Сомостійною ходою
E Пішки з медсестрою

56 У пацієнта з туберкульозом легень було виявлено кровохаркання. Вкажіть, яке положення найбільш доцільно надати пацієнту:
A *Напівсидяче
B Лежаче
C Лежаче на правому боці
D Лежаче на лівому боці
E Лежаче на спині

57 Який дезінфікуючий розчини використовують для вологого прибирання у пологових будинках?
A *0,2% розчин Бланідас
B 0,5% розчин мийного засобу
C 5% хлорного вапна
D 6% розчин перекису водню
E 10% хлорного вапна

58 Як часто потрібно проводити генеральне прибирання у палатах новонароджених пологового будинку?

A *Через кожні 3 дні
B 1 раз на тиждень
C Кожен день
D 2 рази на тиждень
E Через кожні 5 днів

59 Як часто слід проводити генеральне прибирання у пологовому будинку в індивідуальних пологових залах?
A *Щоразу після пологів
B 1 раз на тиждень
C 2 рази на тиждень
D 1 раз на 3 дні
E 2 рази на добу

60 Як часто слід проводити вологе прибирання палат у пологовому будинку?
A *Не менше 2-х разів в день
B Щоденно
C По мірі необхідності
D 1 раз на тиждень
E 3 рази на тиждень

61 Вкажіть який розчин є протипоказаним для проведення санітарної оборбки при педикульозі вагітних та дітей до 5 років:
A *0,15% водно-емульсійний розчин карбофосу
B Мильно-порошкова емульсія
C 5% борна мазь + 0,25% емульсія дикрезилу + 10% розчин оцтової кислоти
D 4% розчин соди + 10% розчин оцтової кислоти
E 0,5% розчин метилацетафосу

62 Акушерка проводить предстерелізаційну очистку медичного інструментарію. Вкажіть, яку пробу повинна вона провести на залишки миючих засобів:
A *Фенолфталеїнову
B Ортотолуїдинову
C Бензидинову
D Амідопиринову
E Азопірамову

63 Пацієнтці призначений загальний аналіз сечі. Вкажіть необхідну кількість сечі для даного дослідження:
A *100-200 мл
B 5-10 мл
C 15-20 мл
D 30-50 мл
E 50-100 мл

64 Пацієнтці призначено катетеризацію сечового міхура м’яким катетером. Назвіть найбільш часте ускладнення при проведенні катетеризації сечового міхура:
A *Занесення інфекції у сечовивідні шляхи
B Гематурія
C Розрив уретри
D Обтурація сечовивідного каналу
E Поява алергійної реакції

65 Вкажіть найбільш доцільний метод стерилізації гумових катетерів багаторазового використання:
A *Паровий метод
B Кип'ятіння
C Хімічний метод
D Повітряний метод
E Іонізуюче опромінення

66 Вкажіть температуру та час стерилізації медичного інструментарію в сухожаровій шафі:
A *180° - 60 хв.
B 180° - 55 хв.
C 180° - 45 хв.
D 160° - 50 хв.
E 160° - 60 хв.

67 Пацієнтці 50-ти років лікар призначив лікувальну клізму з 50 мл обліпихової олії. Що потрібно зробити перед даною маніпуляцією?
A *Очисну клізму
B Краплинну клізму
C Гіпертонічну клізму
D Сифонну клізму
E Олійну клізму

68 Пацієнтці призначено введення цефтріаксону по 300000 ОД. У флаконі 500000 ОД. Як виконати розведення антибіотика та скільки мл розчину набрати в шприц?
A *Ввести у флакон 5 мл розчинника, набрати в шприц 3 мл розчину
B Ввести у флакон 10 мл розчинника, набрати в шприц 7 мл розчину
C Ввести у флакон 10 мл розчинника, набрати в шприц 6 мл розчину
D Ввести у флакон 10 мл розчинника, набрати в шприц 5 мл розчину
E Ввести у флакон 5 мл розчинника, набрати в шприц 4 мл розчину

69 Назвіть розчин, який можна використати для розведення антибіотику для постановки діагностичної проби на індивідуальну чутливість:
A *0,9% розчин натрію хлориду
B 0,25% розчин новокаїну
C 0,5% розчин новокаїну
D 2% розчин новокаїну
E 40% розчин глюкози

70 Пацієнтка з цукровим діабетом І-го типу тривалий час вводить собі інсулін тільки в зовнішню поверхню стегна. Яке ускладнення може виникнути?
A *Ліподистрофія
B Алергічна реакція
C Некроз тканини
D Тромбофлебіт
E Інфільтрат

71 Після проведеної внутрішньовенної інфузії на місці венепункції утворилася гематома. Що є найбільш вірогідною причиною цього ускладнення?
A *Прокол обох стінок вени

B Алергічна реакція
C Ушкодження нервового стовбура
D Прокол м’язів
E Дуже щільно накладений джгут

72 Пацієнтка через дві доби після проведеної операції скаржиться на біль в животі, здуття, не відходження газів. Яке втручання необхідно здійснити на даному етапі?
A *Ввести газовідвідну трубку
B Ввести спазмолітики
C Покласти міхур з льодом на живіт
D Ввести знеболюючі
E Прикласти грілку

73 Вагітній, яка страждає на хронічний холецистит, призначено дієту №5. Як акушерка повинна пояснити жінці та її родичам мету цієї дієти?
A *Хімічне щадіння печінки в умовах повноцінного харчування, покращення жовчовиділення
B Підтримання загальних сил організму і підвищення його опірності
C Нормалізація обміну речовин, покращення кровообігу
D Забезпечення фізіологічно повноцінного харчування
E Покращення виведення із організму продуктів обміну речовин

74 При дослідженні пульсу у вагітної жінки, акушерка визначила, що частота пульсу складає 50/хв. Як оцінити таку частоту пульсу?
A *Брадикардія
B Аритмія
C Тахікардія
D Пароксизмальна тахікардія
E Ниткоподібний

75 Пацієнтці , яка лікується з приводу хронічного гастриту, призначена дієта №1. Яка мета даної дієти?
A *Обмеження механічного і хімічного подразнення слизової оболонки травного каналу
B Нормалізація секретної та моторної функції кишечнику
C Нормалізація обміну пуринів
D Зменшення набряків
E Покращення кровообігу

76Акушерка проводить санітарну обробку вагітній жінці з педикульозом. Який протипедикульозний засіб можна використати в даній ситуації?
A *5% борну мазь
B 0,15% водно-емульсійний р-н карбофосу
C 1% р-н хлораміну
D 5% р-н перманганату калію
E 3% р-н оцтової кислоти

77 Акушерка, здійснючи догляд за породіллями, повинна дотримуватись лікувально-охоронного режиму. Який із наведених заходів є його елементом?
A *Дотримання тиші
B Прибирання приміщень
C Дієтичне харчування
D Виконання призначень лікаря

E Провітрювання палат

78 Якою повинна бути температура повітря у палатах полового відділення для породіль?
A *21-22°*C*
B 14-16°*C*
C 16-18°*C*
D 27-29°*C*
E 30-32°*C*

79 Акушерка проводить контроль якості перед стерилізаційної очистки інструментів. З якою метою вона проводить фенолфталеїнову пробу?
A *Для виявлення залишків миючого засобу
B Для виявлення залишків крові
C Для виявлення дезінфікуючого засобу
D Для оцінки придатності інструментів до використання
E Для оцінки правильності проведення автоклавування

80Внаслідок проведеної акушеркою внутрішньом'язевої ін'єкції породіллі у місці ін'єкції з'явилась сильна біль, яка віддає в стегновий і литковий м'яз. Що є найбільш вірогідною причиною цього ускладнення?
A *Ушкодження нервового стовбура
B Прокол м'язів
C Ушкодження окістя
D Прокол вени
E Утворення інфільтрату

81 Лікувальне харчування базується на трьох основних принципах. Що передбачає щадний режим харчування?
A *Оберігання хворого органа чи системи органів від механічних, хімічних та термічних чинників
B Базується на зменшенні чи збільшенні в харчовому раціоні того чи іншого продукту
C У харчовий раціон вводять речовини, в яких організм відчуває нестачу
D Повноцінне постачання організму різними харчовими речовинами
E Дотримання режиму харчування

82 У приймальному відділенні пологового будинку в процесі приймання та саноброблки у роділлі розпочалися потуги та виникла кровотеча. Які першочергові дії акушерки?
A *Викликати чергового лікаря
B Поставити очисну клізму
C Зголити волосяний покрив із зовнішніх статевих органів
D Застосувати міхур з льодом
E Виміряти артеріальний тиск

83 У пологовому відділенні провели пологи у жінки 25-ти років, яка хвора на СНІД. Яку дезінфекцію необхідно провести після виписування хворої?
A *Заключну
B Профілактичну
C Поточну
D Вогнищеву
E Осередкову

84 Акушерка провела туалет породіллі зі швами на промежині. Який розчин використає

акушерка для догляду за швами?
A *1% розчин діамантового зеленого
B 70% розчин етилового спирту
C 2% розчин борної кислоти
D 5% розчин йоду
E 2% розчин натрію гідрокарбонату

85 Акушерка проводить санітарну обробку породіллі,зрізаючи нігті на руках і ногах. Нігтьові ложа обробила 5% розчином йоду. Вкажіть, яку дезінфекцію ножиць повинна здійснити акушерка після використання:
A *Занурити у 70% р-н етилового спирту на 6 год. з наступним промиванням проточною водою
B Занурити на 15 хв. у 3% р-н пероксиду водню з наступним промиванням проточною водою
C Занурити в хлоргексидин на 45 хв з наступним промиванням проточною водою
D Занурити на 15 хв. у 30° р-н етилового спирту з наступним промиванням проточною водою
E Занурити на 15 хв. у 2% р-н соди з наступним промиванням проточною водою

86 Після ускладнених пологів акушерка за призначенням лікаря здійснює повторну катетеризацію сечового міхура. Який розчин використає акушерка з метою профілактики цистіту у роділлі?
A *10 мл теплого розчину фурациліну
B 5 мл р-ну калію перманганату
C 10 мл 70° етилового спирту
D 15 мл 2 % р-ну натрію гідрокарбонату
E 10 мл 5% р-ну борної кислоти

87 Жінці 32-х років, яка знаходиться на лікуванні у гінекологічному відділенні було призначено в/м 5 мл 5% р-ну кальцію глюконат. Під час повторного виконання процедури, жінка поскаржилась на різкий, пекучий біль. Яка найбільш доцільна лікувальна тактика акушерки в даному випадку?
A *Припинити ін’єкцію і перевірити етикетку ампули з-під ліків
B Ввести ліки і прикласти грілку
C Зробити йодну сітку на місці ін’єкції
D Місце ін’єкції обколоти 5% р-ном новокаїну
E Ввести ліки і виконати УФ-опромінення місця ін’єкції

88 В фельдшерсько-акушерський пункт звернулась жінка 25-ти років зі скаргами на біль, ущільнення в ділянці сідниць після курсу аутогемотерапії. Яке найбільш вірогідне ускладнення виникло?
A *Інфільтрат
B Алергічна реакція
C Тромбофлебіт
D Абсцес
E Некроз тканини

89 Жінці 28-ми років, акушерка за призначенням лікаря ввела роділлі з нефропатією в/м 5 мл 25% р-ну магнію сульфат. Що повинна далі зробити акушерка з використаним шприцом?
A *Продезінфікувати, використовуючи правило двох ємкостей
B У зібраному вигляді опустити в дез. розчин

C Віддати старшій мед. сестрі
D Передати в ЦСВ
E Викинути в сміттєзбірник

90 Акушерка виконала породіллі за призначенням лікаря пробу на індивідуальну чутливість до антибіотика. Відповідний запис про негативний чи позитивний результат вона записує:
A *У листку лікарських призначень
B На окремому аркуші
C У листку спостережень
D На титульну сторінку історії пологів
E В амбулаторній картці

91 Жінці 25-ти років, яка знаходиться в пологовому будинку із загрозою внутрішньоутробної асфіксії плода призначено в/в введення 40% р-ну глюкози + 5% р-н аскорбінової кислоти 10 мл. Які вена найчастіше використовується для в/в ін'єкцій?
A *Вени ліктьового згіну
B Вени передпліччя
C Вени нижніх кінцівок
D Вени кістей
E Вени голови

92 Акушерка ввела породілля за призначенням лікаря в/м 5,0 мл баралгіна. Вказати, на який час повинна занурити акушерка використаний шприц в дезінфікуючий розчин:
A *60 хв.
B 40 хв.
C 15 хв.
D 20 хв.
E 30 хв.

93 Вагітній жінці, 32-х років, хворій на цукровий діабет, лікарем-гінекологом був призначений аналіз сечі на глюкозу. За який проміжок часу повинна зібрати сечу жінка?
A *За 24 години
B За 12 годин
C За 10 годин
D За 8 годин
E За 7 годин

94 Вагітній жінці, 31-го року, яка хворіє на неспецифічний виразковий коліт, лікарем призначено аналіз калу на приховану кров. Які медикаменти потрібно виключити з призначень перед збиранням калу на приховану кров?
A *Які містять йод, бром, залізо
B Які містять вітаміни групи В
C Які містять вісмут, кальцій
D Які містять кальцій, магній
E Які містять бром, йод

95 Акушерці під час забору крові на біохімічне дослідження кров потрапила у око. Які подальші дії акушерки?
A *Промити око водопровідною водою
B Промити дистильованою водою
C Промити р-ном фурациліну 1:5000

D Промити перекисом водню
E Промити 5% р-ном калію перманганату

96 Скільки потрібно порошку хлораміну для приготування 1 літру 3% розчину хлораміну?
A *30 г
B 5 г
C 10 г
D 15 г
E 100 г

97 Яку максимальну кількість розчину можна вводити внутрішньом'язово одноразово?
A *10 мл
B 2 мл
C 5 мл
D 15 мл
E 20 мл

98 Який наказ МОЗ України передбачає профілактику розповсюдження СНІДу?
A *Наказ №955
B Наказ №450
C Наказ №460
D Наказ №410
E Наказ №408

99 Яке положення слід надати пацієнту, у якого розвинувся набряк легень після чергової гіпертонічної кризи?
A *Напівсидяче положення у ліжку
B Сидяче в кріслі
C Горизонтальне на спині
D З опущеним головним кінцем
E На провому боці в ліжку

100 Які дії передбачає знезараження шприців та голок після їх використання?
A *Занурення в 0,2% розчин дезактину на 1 годину
B Занурення в 0,5% миючий розчин на 1 годину
C Занурення в 3% розчин перекису водню на 1 годину
D Занурення в 70% розчин етилового спирту на 1 годину
E Занурення в 96% розчин етилового спирту на 1 годину

101 При яких станах хворого застосування міхура з льодом протипоказане?
A *І-й період гарячки
B Кровотеча
C ІІ-й період гарячки
D Травми в перші години
E Після пологів в перші 2 години

102 Який термін часу затримки сечовиділення є показанням для катетеризації сечового міхура?
A *10-12 годин
B 9-15 годин
C 12-18 годин

D 12-24 години
E 3-6 годин

103 У пацієнтки, 55-ти років під час обєктивногообстеження виявлено дефіцит пульсу. Що входить в поняття дефіцит пульсу?
A *Різниця між частотою серцевих скорочень та частотою пульсу
B Сума частоти серцевих скорочень та частоти пульсу
C Різниця між частотою пульсу та частотою серцевих скорочень
D Різниця між частотою пульсу та частотою дихання
E Сума частоти пульсу та частоти дихання

104 Яка дієта показана при захворюваннях серцево-судинної системи?
A *Стіл №10
B Стіл №8
C Стіл №7
D Стіл №5
E Стіл №3

105 В приемном отделении родильного дома акушерка проводит обследование роженицы, 28-ми лет, подсчитывает частоту дыхания. Какой должна быть в норме частота дыхания?
A *16-20/мин.
B 10-12/мин.
C 12-16/мин.
D 20-24/мин.
E 24-28/мин.

106 В послеродовой палате акушерка проводит исследование пульса у родильницы, 23-х лет. Какие характеристики пульса она должна определить?
A *Ритм, частота, наполнение, напряжение
B Частота, высота, наполнение
C Величина, наполнение, напряжение
D Ритм, скорость, высота
E Напряжение, скорость, величина

107 В отделении патологии беременных находится на лечении пациентка, 32-х лет, с диагнозом хронический пиелонефрит. Лечащий врач назначил исследование мочи по Зимницкому. Как часто на протяжении суток нужно собирать мочу у пациентки?
A *Каждые 3 часа
B Каждые 2 часа
C Каждые 4 часа
D Каждые 6 часов
E Каждые 8 часов

108 В послеоперационной палате находится пациентка, 27-ми лет после операции кессарева сечения. Ей назначен постельный режим. Медсестра проводит мероприятия по профилактике пролежней. Какой раствор она должна использовать для обработки кожи в местах возможного образования пролежней?
A *10% раствор камфорного спирта
B 1% раствор калия перманганата
C 3% раствор перекиси водорода
D 2% раствор гидрокарбоната натрия

E 1:5000 раствор фурацилина

109 В отделении патологии беременных находится пациентка, 32-х лет, страдающая митральным пороком сердца, хронической недостаточностью кровообращения. Лечащий врач назначил контроль водного баланса. Что следует учитывать, выполняя данное назначение?
A *Соотношение введенной в организм жидкости и суточного диуреза
B Соотношение дневного и ночного диуреза
C Количество введенной в организм жидкости за сутки
D Суточное количество мочи
E Разницу между утренними и вечерними показателями массы тела

110 В отделении патологии беременных находится на лечении пациентка, 30-ти лет, с диагнозом язвенная болезнь. Лечащий врач назначил анализ кала на скрытую кровь. Какую диету должна соблюдать пациентка в течении 3-х дней?
A *Безгемоглобиновую
B С ограничением соли
C Бесшлаковую
D Калийсберегающую
E С ограничением жидкости

111 В гинекологическом отделении находится на обследовании пациентка, 32-х лет, которая имеет сопутствующий диагноз хронический колит. В связи с наличием запора, лечащий врач назначил очистительную клизму. Какое положение должна занять пациентка при проведении манипуляции?
A *На левом боку
B На правом боку
C На животе
D На спине
E Коленно-локтевое

112 В отделении патологии беременных находится пациентка, 28-ми лет, страдающая хроническим холециститом. По назначению врача ей проводят 3-х фазное дуоденальное зондирование. Медсестра зондового кабинета получила первую порцию желчи, затем ввела в зонд 50 мл теплого раствора 33% раствора сульфата магния, наложила зажим на зонд на 10 минут, а затем из зонда стала выделяться вязкая жидкость темно-оливкового цвета. Как называется эта порция?
A *Пузырная желчь
B Дуоденальная желчь
C Желчь из внутрипеченочных протоков
D Панкреатический сок
E Желудочный сок

113 В отделении патологии беременных находится пациентка, 25-ти лет, с диагнозом сахарный диабет I-го типа. Медсестра процедурного кабинета готовит пациентке инъекцию инсулина. Сколько мл инсулина она должна набрать в шприц емкостью 2 мл, если назначена доза 16 ЕД (1 мл инсулина - 40 ЕД)?
A *0,4 мл
B 0,6 мл
C 0,5 мл
D 0,3 мл
E 0,2 мл

114 Акушерка родильного зала в начале рабочего дня вскрыла стерильный бикс с перевязочным материалом. В течении какого времени можно использовать материалы из данного бикса?
A *24 часов
B 48 часов
C 12 часов
D 10 часов
E 6 часов

115 В отделении патологии беременных медсестра процедурного кабинета утром взяла кровь из вены у 3-х пациенток на ВИЧ-инфекцию. Какой приказ МЗ Украины требует доставки пробирок с кровью в закрытых контейнерах?
A *№955
B №408
C №228
D №59
E №38

116 Акушерка открыла бикс с перевязочным материалом и выявила, что индикатор стерильности не разплавился. Какие дальнейшие действия акушерки?
A *Отправить бикс на повторную стерилизацию
B Отослать материал на бактериологическое исследование
C Написать докладную записку главному врачу
D Получить подтверждение записи в “Журнале учета стерилизации” в ЦСО
E Использовать перевязочный материал для работы

117 Укажите время стерилизации в автоклаве под давлением 2 атм, Т- 132°*С*:
A *20 мин.
B 15 мин.
C 45 мин.
D 60 мин.
E 120 мин.

118 Ви акушеркаполгвого відділення. Вас викликала пацієнта, в якої виникло блювання “кавової гущі”. З анамнезу відомо, що хворіє на виразкову хворобу. Який лікарський препарат за призначенням лікаря застосує акушерка для надання невідкладної допомоги?
A *Етамзілат натрію
B Кетанов
C Но-шпа
D Мезатон
E Фізіологічний розчин

119 За призначенням лікаря акушерка гінекологічного відділення повинна взяти у вагітної кров на коагулограму. У градуйовану пробірку конусоподібної форми вона набрала 1 мл 3,8% розчину лимоннокислого натрію. Вкажіть, яку кількість крові необхідно набрати у пробірку:
A *9 мл
B 2 мл
C 3 мл
D 5 мл
E 7 мл

120 Пацієнтці з хронічним ентероколітом, лікар призначив іригосокпію. Вкажіть, воду якої оптимальної температури ви застосуєте для постановки очисної клізми:
A *28-32°*C*
B 35-36°*C*
C 35-37°*C*
D 37-38°*C*
E 38-39°*C*

121 Після пологів у жінки впродовж 3-х діб відсутні випорожнення. За призначенням лікаря акушерка повинна поставити пацієнтці очисну клізму. Який об'єм води слід налити у кружку Есмарха?
A. *1-1,5 л
B. 2-3 л
C. 0,5-0,7 л
D. 0,1-0,2 л
E. 3-4 л

122. Вагітна жінка 32-х років знаходиться в гастроентерологічному відділенні зі скаргами на гіркоту в роті, ниючий біль у правому підребер'ї, нудоту, здуття живота. В анамнезі - хронічний холецистит. Яка дієта необхідна хворій?
A. *№5
B. №7
C. №10
D. №1а
E. №15

123. У роділлі 32-х років пологи ускладнились нефропатією. За призначенням лікаря акушерка ввела роділлі внутрішньом'язово у верхньо-зовнішній квадрат сідниці 25% розчин магнію сульфату 5 мл. Ін'єкційну голку потрібно ввести під кутом:
A. *90*o*
B. 70*o*
C. 60*o*
D. 45*o*
E. 30*o*

124. У терапевтичному відділенні знаходиться хворий на бронхоектатичну хворобу. У хворого відділяється харкотиння у великій кількості. Яке положення йому необхідно надати для поліпшення виділення харкотиння?
A. *Дренажне
B. Вимушене
C. Горизонтальне
D. Пасивне
E. –

125. У породіллі 23-х років внаслідок лікування антибіотиками, що вводилися акушеркою внутрішньом'язово 4 рази на добу, утворився інфільтрат. Що, найімовірніше, спричинило виникнення цього ускладнення?
A. * Введення ліків у одне й те саме місце
B. Введення непідігрітого розчину
C. Занадто повільне введення ліків
D. Введення ліків у положенні стоячи

E. Введення ліків голкою №0860

126. Позначаючи в температурному листку показники температури пацієнтки в післяопераційному періоді, акушерка помітила, що коливання ранкової і вечірньої температури дорівнює в межах 1-2*оС*. Вкажіть вид гарячки:
A. *Послаблювальна
B. Постійна
C. Переміжна
D. Хвилеподібна
E. Атипова

127. Які дезінфікуючі розчини використовують для вологого прибирання у пологових будинках?
A. * 6% розчин перекису водню з 0,5% розчином мийного засобу
B. 0,5% розчин хлорного вапна
C. 10% розчин хлорного вапна
D. 1% розчин хлораміну
E. 0,15%розчин хлораміну

128. Пацієнтка 23-х років лікується у гінекологічному відділенні. Після введення антибіотику у хворої раптово виникли запаморочення, біль в грудній клітці, задишка, зниження АТ, ниткоподібний пульс. Яке ускладнення виникло?
A. *Анафілактичний шок
B. Інфаркт міокарда
C. Набряк легень
D.
E. Колапс

129. У пацієнта 28-ми років скарги на біль під час дефекації, виділення слизу та крові з відхідника протягом тижня. Який метод дослідження буде інформативним для з'ясування діагнозу?
A. *Ректороманоскопія
B. Гастроскопія
C. Фіброгастроезофагоскопія
D. Ультразвукове обстеження
E. Рентгеноскопія

130. . Дільнича акушерка жіночої консультації проводить бесіду з вагітноюз приводу особливостей її харчування. Чому повинен дорівнювати приріст маси тіла вагітної за тиждень у другій половині вагітності?
A. *300-350 г
B. 700-800 г
C. 600-700 г
D. 500-600 г
E. 400-450 г

131. Акушерка до проведення огляду вагітної жінки проводить обробку рук. З метоюпрофі лактики передачі інфекції , необхідно мити руки не менше:
A. *30 сек
B. 4 хв
C. 3 хв
D. 2 хв

E. 1 хв

132. Акушерці доручено терміново доставити кров з пологового будинку до лабораторії, яка розташована за межами установи. У якій упаковці необхідно транспортувати даний біологічний матеріал?
A. * У контейнері
B. У картонній коробці
C. У дерев'яному ящику
D. У поліетиленовому пакеті
E. У паперовій обгортці

133. У пацієнтки з пневмонією, на фоні лікування антибіотиками розвинулась криза: температура тіла знизилась протягом 2-х годин з 40, 3*oC* до 36, 2*oC*. При цьому самопочуття погіршилось; пацієнтка зблідла, вкрилась холодним потом, скаржиться на слабкість, потемніння в очах, АТ- 70/40 мм рт.ст., Ps- 100/хв., ниткоподібний. Яке ускладнення найбільш імовірне в даному випадку?
A. * Колапс
B. Непритомність
C. Кардіогенний шок
D. Гостра серцева недостатність
E. –

134. . Вагітній, яка страждає на хронічний гломерулонефрит, призначено дієту №7. Які рекомендації повинна дати акушерка?
A. * Обмеження кухонної солі до 5-6 г на добу
B. Калорійність дієти повинна становити 3600-4000 ккал
C. Слизові супи на перші страви
D. Збільшити споживання рідини до 2 л на добу
E. Виключити прості вуглеводи з раціону

135. Важкохворій породіллі необхідно здійснювати профілактику пролежнів (для покращення кровообігу). Який лікарський засіб потрібно використати?
A. * Камфорний спирт
B. 5% розчин йоду
C. 1% розчин каліюперм анганату
D. 3% розчин пероксиду водню
E. Розчин фурациліну

136. . Акушерка відділення патології вагітності доглядає за жінкою 36-ти років, у якої виявили ознаки гострого панкреатиту. Яку необхідно провести лабораторну діагностичну процедуру для підтвердження діагнозу?
A. * Аналіз сечі на діастазу
B. УЗД
C. Аналіз сечі загальний
D. Аналіз крові загальний
E. Коагулограма

137. У хворої після введення пеніциліну через 5 хвилин раптово з'явились різка слабкість, запаморочення, відчуття страху, ядуха, стиснення в грудній клітці, біль у животі. Стан хворої важкий. Шкіра бліда, волога. Пульс ниткоподібний, гіпотонія. Які першочергові дії акушерки?
A. * Обколоти 0,1% адреналіном

B. Ввести еуфілін
C. Ввести 20% розчин кофеїну
D. Покласти грілку
E. Ввести строфантин

138. У вагітної 22-х років спостерігається нездужання, температура - 39,6*оС*. Протягом 2-х годин виникло різке зниження температури до 35,8*оС*. Об'єктивно:пульс став ниткоподібним, відмічається загальна слабкість, значне потовиділення. Яке ускладнення виникло у пацієнтки?
A. * Критичне зниження температури
B. Підвищення температури
C. Збереження температури
D. Літичне зниження температури
E. Фебрильна температура

139. У відділенні перебуває вагітна, якій призначено щоденні внутрішньовенні вливання. Під час чергового підключення системи до підключичного катетера, виявилось, що рідина не надходить у катетер через його непрохідність. Вкажіть подальші дії акушерки:
A. * Промити катетер 1 мл 1% розчину гепарину
B. Замінити катетер
C. Промити катетер 1 мл 5% розчину гепарину
D. Промити катетер 1 мл 10% розчину *NaCl*
E. Не підключати систему

140. Пацієнтці гінекологічного відділення лікар призначив введення газовідвідної трубки. Через який час повинна забрати акушерка газовідвідну трубку у пацієнти?
A. * 2 години
B. 3 години
C. 4 години
D. 5 годин
E. 6 годин

141. Для запобігання помилкового наповнення балонів іншими газами передбачено розпізнавальне фарбування балонів. В який колір пофарбований балон для зберігання кисню?
A. * Блакитний
B. Чорний
C.Жовтий
D. Білий
E. Червоний

142. Акушерка бере участь у лікуванні пацієнтки з хронічним ентероколітом. Який дієтичний стіл слід рекомендувати пацієнтам із кишковими розладами?
A. * Стіл №4
B. Стіл №1
C. Стіл №5
D. Стіл №7
E. Стіл №11

143. У породіллі при критичному зниженні температури тіла з'явились наступні

симптоми: різка блідість шкіри, холодний липкий піт, загострені риси обличчя, прискорене поверхневе дихання, ниткоподібний пульс, зниження артеріального тиску. Вкажіть стан, який виник у пацієнтки:
A. * Колапс
B. Непритомність
C. Емболія
D. Інсульт
E. Кома

144. Вагітна жінка знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу гострого пієлонефриту. Після в/м'язового введення антибіотику погіршився стан: з'явилася слабкість, тремтіння тіла, свербіж шкіри, нудота. Через декілька хвилин во на знепритомніла. Шкіра бліда, пульс - 102/хв., АТ- 80/40 мм рт.ст.
Яка невідкладна долікарська допомога?
A. * Холод на місце ін'єкції, обколоти місце ін'єкції адреналіном
B. Горизонтальне положення, дати нашатирний спирт
C. Горизонтальне положення, дати зволожений кисень
D. Напівсидяче положення, гірчичники на грудну клітку
E. Горизонтальне положення, грілку до ніг

145. Лікар призначив дитині дослідження сечі за Нечипоренком. Яку порцію сечі необхідно зібрати для дослідження?
A. * Середню порцію ранкової сечі
B. Всю ранкову сечу
C. Нічну порцію сечі
D. Добову сечу
E. Будь-яку порцію сечі

146. * Ви працюєте акушеркою. З метою профілактики внутрішньолікарняної інфекції проводиться бактеріологічний посів з рук. Як часто його необхідно проводити?
A. Один раз в квартал
B. Щомісяця
C. Один раз на рік
D. Два рази на рік
E. Після захворювання

147. Пацієнтка через 7 годин після кесаревого розтину скаржиться на відсутність сечовиділення. Сечовий міхур переповнений, позиви до сечовипускання. Яка тактика акушерки?
A. * Виконати катетеризацію сечового міхура
B. Підкласти судно
C. Застосувати міхур з льодом на сечовий міхур
D. Ввести спазмолітичні засоби
E. Ввести сечогінні препарати

148. Упаці єнтки 37-ми років з порушенням менструального циклу акушеркою виявлені ознаки залізодефіцитної анемії. Вкажіть, які з перерахованих продуктів найбільш доцільно включити в раціон:
A. * Яблука, гранати, печінку
B. Картоплю, огірки, цибулю
C. Ананаси, ківі, банани
D. М'ясо, сало, вершки

E. Буряк, картопля, морква

149. Хворій лікар призначив дослідження сечі на діастазу. Як треба зібрати сечу для цього дослідження?
A. * 50 мл сечі свіжовипущеної і теплої
B. Сечу збирають за 24 години
C. Ранком, 100-150 мл сечі
D. Середню порцію сечі у будь-який час
E. Сечу збирають за 3 години

150. Жінці 42-х років, хворій на гострий аднексит, лікарем-гінекологом було призначено в/м введення цефтріаксона по 1 г два рази на день. Перед введенням антибіотика акушеркою була проведена в/ш проба на чутливість до лікарського засобу. Через який час потрібно оцінити результат даної проби?
A. * Через 20 хвилин
B. Через 30 хвилин
C. Через 1 годину
D. Через 3 години
E. Через добу

151. Вагітній жінці введено периферійний катетер для проведення інфузійної терапії. За призначенням лікаря, акушерці необхідно здійснити забір венозної крові для біохімічного дослідження. Вкажіть розчин, яким необхідно попередньо промити катетер:
A. * 1% розчином гепарину
B. 0,9% розчином натрію хлориду
C. 3% розчином пероксиду водню
D. 2% розчином натрію гідрокарбонату
E. Розчином фурациліну 1:5000

152. Акушерці пологового відділення необхідно пояснити молодшій медичній сестрі умови генерального прибирання в маніпуляційному кабінеті даного відділення. Вкажіть періодичність генерального прибирання в маніпуляційному кабінеті:
A. * Один раз на тиждень
B. Один раз на місяць
C. Щоденно
D. Кожну зміну
E. На початку і в кінці зміни

153. До вас звернулась пацієнтка зі скаргами на напад болю у попереку, який іррадіює в стегно, промежину. В анамнезі сечокам'яна хвороба. Яка долікарська допомога першочергова?
A. * Грілка на поперек
B. Міхур з льодом на поперек
C. Знеболюючі засоби
D. Сечогінні засоби
E. Міхур з льодом на епігастральну ділянку

154.У потерпілого 19-ти років констатовано клінічну смерть. Проводиться серцево-легенева реанімація. Що з переліченого свідчить про ефективність закритого масажу серця?
A. * Пульсація на сонній артерії

B. Пасивні рухи грудної клітки
C. Зниження температури тіла
D. Відсутність свідомості
E. Розширені зіниці

155. У пацієнтки 46-ти років, яка страждає на артеріальну гіпертензію, виникла носова кровотеча. Яким розчином слід зволожити ватні кульки для її зупинки?
A. * 3% розчин перекису водню
B. 0,2% розчин фурациліну
C. 0,2% розчин перманганату калію
D. 2% розчин натрію гідрокарбонату
E. 2% розчин натрію хлориду

156. У відділенні перебуває вагітна, якій призначено щоденні внутрішньовенні вливання. Під час чергового підключення системи до підключичного катетера, виявилось, що рідина не надходить у катетер через його непрохідність. Вкажіть подальші дії акушерки:
A. * Промити катетер 1 мл 1% розчину гепарину
B. Замінити катетер
C. Промити катетер 1 мл 5% розчину гепарину
D. Промити катетер 1 мл 10% розчину *NaCl*
E. Не підключати систему

157. Пацієнтка гінекологічного відділення, під час приступу бронхіальної астми приймає вимушене положення, яке полегшує її стан: сидить, впираючись руками в край ліжка. Вкажіть положення, яке займає пацієнтка:
A. * Ортопное
B. Фаулера
C. Сімса
D. Вимушене
E. Пасивне

158. Дитині 3 роки. Скарги матері на підвищення температури тіла до 38*оС*, відсутність апетиту, нудоту, біль в животі, часті болісні сечовипускання, сеча каламутна. Лікарем призначена проба сечі заНечипоренком.
Сутність даної проби полягає в:
A. * Визначення кількості лейкоцитів та еритроцитів в 1 мл сечі
B. Визначення ацетону в сечі
C. Визначення кальцію сечі
D. Визначення цукру в сечі
E. Визначення кількості сечі за добу

159. Удитини 10-ти років, що захворіла на гострий гломерулонефрит, наявні проблеми: зменшення кількості виділеної сечі за добу, підвищення АТ, набряки на обличчі. В гострий період дієта №7 повинна бути:
A. * Безсольова
B. 1,5 г солі на добу
C. 1-2 г солі на добу
D. 3-5 г солі на добу
E. 5 г солі на добу

160. Удитини 5-ти років спостерігається набряк мигдаликів, незначне білувате

нашарування, збільшення регіональних лімфовузлів. Лікар запідозрив дифтерію та призначив з метою підтвердження діагнозу бактеріологічне дослідження мазку. З яких ділянок необхідно взяти мазок?
A. * Зів та ніс
B. З-під язика
C. Носогорло
D. Зів
E. Задня стінка глотки

161. Ви акушеркаФАПу.Потерпілий 40-ка років після дорожньо-транспортної пригоди в стані непритомності, не визначається пульс на сонних артеріях, дихання відсутнє, зіниці розширені, рефлекси відсутні, шкіра блідо-сірого кольору. Визначте важкість стану потерпілого:
A. * Клінічна смерть
B. Агонія
C. Преагонія
D. Дуже тяжкий
E. Середньої тяжкості

162. Употерпі лого діагностовано клінічну смерть. Яке співвідношення натискань на грудну клітку та вдихів при проведенні серцево-легеневої реанімації у дорослого?
A. * 30:2
B. 2:30
C. 2:15
D. 1:5
E. 5:1

163. До гінекологічного відділення надійшла жінка з діагнозом: позаматкова вагітність, розрив труби. При підготовці доопераціі необхідно **ВИКЛЮЧИТИ**:
A. * Очисну клізму
B. Промивання шлунка
C. Туалет статевих органів
D. Катетеризацію сечового міхура
E. Премедикацію

164. У дівчинки 5-ти років скарги на зниження апетиту, слабкість, млявість. Об’єктивно: шкіра бліда, набряки на обличчі, АТ- 130/80 мм рт.ст., сеча кольору ”м’ясних помиїв”. Який метод лабораторної діагностики повинна провести акушерка для визначення видільної та концентраційної функції нирок?
A. * Аналіз сечі за Зимницьким
B. Загальний аналіз сечі
C. Аналіз сечі за Нечипоренком
D. Аналіз сечі за Амбурже
E. Аналіз сечі за Аддіс-Каковським

165. У пацієнтки під час складних пологів протягом 4 хвилин були відсутні дихання, пульс та АТ, зіниці не реагували на світло. Після проведення реанімаційних заходів вдалося відновити серцеву та дихальну діяльність, повернулася свідомість. Як називається цей стан?
A. * Клінічна смерть
B. Біологічна смерть
C. Передагональний стан

D. Агонія
E. Кома

166. Ви працюєте акушеркою приймальноглядового відділення пологового будинку. Під час огляду вагітної у приймальному відділенні було виявлено головний педикульоз. Вкажіть номер наказу, який регламентує обробку при педикульозі:
A. *№ 38
B.№ 120
C.№ 720
D.№ 288
E.№ 408